

Die chirurgische Behandlung
des

Hydrops anasarka.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Arthur Schabert,

Rigensis

Ordentliche Opponenten:

Priv.-Doc. Dr. F. Krüger. — Prof. Dr. R. Thoma. — Prof. Dr. C. Dehio.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1889.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Dorpat, den 20. Mai 1889.

Referent: Professor Dr. K. Dehio.

Nr. 191.

Decan: Dragendorff.

DEM ANDENKEN

Dr. med. Friedrich August von Haken

gewidmet.




Digitized by the Internet Archive
in 2026

Bevor ich die Dorpater Universität verlasse, fühle ich mich gedrungen, allen meinen hochverehrten Lehrern hiermit den Ausdruck schuldigen Dankes entgegenzubringen.

Insbesondere danke ich Herrn Prof. Dr. C. Dehio, für die grosse Liebenswürdigkeit, mit der er sich an der Förderung dieser Arbeit betheiligte.

Das Thema zur vorliegenden Dissertation, deren Bearbeitung auf Grund eines im Stadtkrankenhause zu Riga niedergelegten casuistischen Materials erfolgte, verdanke ich Herrn Dr. P. Hampeln, dirigirendem Arzte der internen Abtheilung daselbst. Ihn bitte ich auch an dieser Stelle für das thätige Interesse, das er an der Arbeit nahm, meines wärmsten Dankes und meiner Ergebenheit versichert zu sein.



I. Einleitung.

Bei Abfassung der vorliegenden Arbeit verfolgte ich den Zweck, die der Behandlung der Hautwassersucht dienlichen chirurgischen Methoden vergleichsweise einander gegenüberzustellen. Bei einem solchen Vergleiche kam es hauptsächlich auf zweierlei an:

erstens festzustellen, wie groß die mit den einzelnen Methoden verknüpfte Gefahr der Wundcomplicationen ist, und darnach die am meisten zu empfehlende Methode zu eruiren;

zweitens über den therapeutischen Nutzen der einzelnen Methoden ein Urtheil zu gewinnen.

Ersteres ist leicht aus den Ergebnissen eines casuistischen Materials zu entscheiden;

dagegen ist die Entscheidung der Frage, ob mit der mechanischen Entleerung des Hautwassers ein curativer Nutzen verbunden gedacht werden muß, weit schwieriger; sie setzt zunächst eine richtige Vorstellung voraus von dem Schaden, der durch die bestehende Anwesenheit des Anasarakas für den Träger desselben erwächst. In dieser Hinsicht verlegt die vorliegende Arbeit den Schwerpunkt ihrer Anschauung dahin, daß jedes Oedem, also auch das der Haut, ein mächtiges Cirkulationshinderniß repräsentirt, dessen Fortschaffung eine ernste, therapeutische Aufgabe ist. Diese

Anschauung ist gewiss keine neue, indess ist sie bisher zu wenig betont worden, vielleicht deswegen, weil die Thatfachen, welche dieser Behauptung zu Grunde liegen, sehr complicirte genannt werden müssen und zu einer allgemeinen Anerkennung und Würdigung noch nicht gelangt sind. Geschieht dieses, dann ist auch der chirurgischen Behandlung der Hautwässerfucht in gewissen, später zu kennzeichnenden Fällen eine grössere Bedeutung zuzuschreiben, als das bisher geschehen ist.

Durch das Zurückgreifen auf die ältere, dieses Capitel der Therapie betreffende, Literatur, hoffe ich sowohl der Pflicht mit Recht üblicher Pietät nachgekommen zu sein, als auch besonders aus der grossen Menge der Erfahrungen das Wesentliche für unsere heutigen Anschauungen nutzbar gemacht zu haben.

II. Historischer Rückblick.

I. Die Methoden der Alten.

(Scarification und Incision.)

Die historische Betrachtung unseres Gegenstandes zeigt, daß zu allen Zeiten das Anafarka, den energischsten, therapeutischen Curen trotzend, den Patienten peinlichst belästigend und gefährdend chirurgisches Eingreifen nöthig gemacht hat. Nicht zu verkennen ist das Bemühen der Alten durch Aufzählung solcher Fälle, wo Natur oder Zufall den Weg zum chirurgischen Verfahren vorzuzeichnen schienen, jeden Zweifel an der Berechtigung zu solchem Handeln zu vernichten. Je sonderbarer die Ereignisse waren, desto mehr hoffte man durch sie zu bekehren. In dieser Absicht referirt Purrman¹⁾ folgenden frappirenden Fall: «ein Hydropischer genafs seines jahrelangen Leidens, nachdem circa 40 frei werdende Knochen splitter die Haut von innen durchsetzten und so dem Wasser freien Abfluß verschafften.» Dennoch hat es nie an gegnerischen Zweiflern gefehlt.

In den ältesten Zeiten ward lange die kurze Lehre des Hippocrates²⁾ befolgt: «si tumor constiterit in scroto et femoribus et tibiis acuto scalpello multa et frequentia vulnuscula incutito. Et si haec feceris, cito sanum efficies.»

1) Laura chir. part. 2. c. 12 cit. nach Hadr. Slevogt. Decani prolusio inaug. Jenae 1697.

2) De int. affect. 24. 25.

Wenn wir in dieser Vorschrift der Scarification das Wort geredet sehen, so ist aus der Beschreibung des Asclepiades¹⁾ mit Bestimmtheit zu entnehmen, daß der «tiefe Schnitt», der ausgiebig Haut und Unterhautzellgewebe durchsetzt und in der Neuzeit von Traube und Ziemssen eine Zeit lang geübt wurde, den Vorzug vor den vielen Scaricatorwunden erhalten hat. Ausdrücklich wird betont, daß die Wunde sich dann leichter ohne Erysipel erhalten lasse (*citra omnem inflammationem*). Durch Bindencompression werde der Abfluß sistirt, durch Lockerung des Verbandzeuges lasse er sich wieder hervorrufen. Ein ebenso entschiedener Lobredner der chirurg. Methode ist Archigenes²⁾, der sicheren Effekt der Methode nachsagt und vor denen warnt, die dieselbe discreditiren. Gleichen Sinnes ist Leonides. Cornelius Celsus³⁾ stellt als den Ort der Wahl die Gegend über dem talus hin; hier solle 4 fingerbreit über demselben eingeschnitten werden, eine Vorschrift, die wie alles Schematische, sich bis tief ins Mittelalter hinein conservirt hat.

Während von den Methodikern des II. Jahrhunderts Galenus⁴⁾ die Scarification beibehält, sehen wir Caelius Aurelianus⁵⁾ wieder auf den tiefen Schnitt zurückgreifen, der Scarification dagegen nur als effektvollen Unter-

1) Cit. nach Aetius tetrabibli III, serm. II, caput XXX. — «ea profunditate, qua quis in venae-sectione utatur . . . » si quis velit, excretionem plurima facta, eam cohibere, nihil vetuerit ipsas in talis fissuras linamentis obturare, ligamentisque constringere, atque ubi rursus prodire quid velimus, laxatis ligamentis et ablatis linamentis gestatogue ac moto aegro excretionem irritare.

2) Cit. nach Aetius l. c.

3) Corn. Celsus, de medicina Lib. III. C. XXI, de hydropo.

4) Galenus, III., de revulsione liber.

5) Cael. Aurelianus, de morb. ac. et chron. Lib. III. de hydropo.

stützungsmittels Erwähnung thun. Der Gefahr des Erysipels vorzubeugen sich bestrebend, verschorft Socrates¹⁾ die Ränder des Schnittes mit dem Glüh Eisen (wodurch andererseits jedoch der Abfluß behindert werden mußte).

Offenbar waren es die zahlreichen Mißerfolge dieser Methoden, die bösen Erfahrungen, die gemacht wurden, als Erysipel, Gangrän, Phlegmonen und Septicaemie dem Eingriff folgten, welche das Interesse am chirurg. Verfahren erkalten ließen. Oribasius²⁾ kennt eine chirurg. Behandlungsmethode der Hautwasserfucht nicht mehr, ja Paulus Aegineta³⁾ läßt sich sogar als warnender Gegner jedes chirurg. Eingriffes vernehmen, wenn er im Capitel «de aqua inter cutem» sagt: «qui vero hydropem ascitem habent, ad perpunctionem deducantur, quae nulli alii hydropi convenit.» So sehen wir den chir. Schnitt im Stich gelassen und andere Mittel an seine Stelle treten, gewiß jedoch nicht zum besseren Heile der so behandelten Patienten.

Rhazes⁴⁾ (Abu Bekr) behandelte seine Patienten mit Fontanellen: eine Frau die seit Jahren an Ascites und Oedemen der Unterextremitäten litt, will er durch die Application von 2 Fontanellen geheilt haben. «Trotzdem die Wunden 3 Monate hindurch das Hautwasser reactionslos abschieden,» haben andere Fälle ihn von dem häufigen Hinzutritt der Gangrän überzeugt.

Bei späteren Autoren findet sich, als Ausdruck mittelalterlicher Kurpfuscherei, eine ganze Reihe höchst zweck-

1) cit. nach Aurelianus l. c.

2) Oribasius, synopsis, Caput: «de aqua inter cutem.»

3) Paulus Aeg. Lib. VI., C. L., de hydropo; Lib. III., C. XLVIII: «solus ascites hydrops chirurgiam amittat.»

4) Rhazes, Zacut. Lusit. Lib. II., observ. 120, 121. cit. nach v. Swieten l. c.

widriger Mittel, zur Behandlung des Anafarkas als nützlich empfohlen. So sehen wir bei Schenk ius¹⁾ (Schenk v. Grafenberg 1572) scarificationes, hirudines, frictiones, ligaturas, vesicatores, caustica, kurz, die ganze Fülle eines gut assortirten Wundarztbesteckes als geeignete Mittelchen aufgeführt. Geradezu barbarisch verfährt Forestus,²⁾ der seine hydropischen Patienten 2 mal am Tage so mit Weidenruthen peitschen liefs, bis sich das Hautwasser durch die Hiebwunden entleerte. Die Reaktion gegen so unvernünftiges Handeln liefs dann auch nicht lange auf sich warten.

Thomas Sydenham³⁾ (1587) bricht mit allen äusseren Mitteln der Behandlung: Versicator, Paracentese und die einzeln geübte Acupunctur werden gleich verworfen, weil die offen bleibenden Wunden schwer zu behandeln seien und dem Zutritt von Erysipel und Gangrän den grössten Spielraum gestatten. Umso mehr mufs es uns Wunder nehmen, wenn Boerhave⁴⁾ (XVII. Jahrhundert) den nützlichen Gebrauch aller jener Wundarztmittel wieder empfiehlt, über die eine milde Kritik bereits abgeurtheilt hatte. Dem Sydenham'schen Radicalismus schliesst sich indes Theophil Bonet⁵⁾ (1682) an, dessen Erfahrung in der Capitelüberschrift ihren prägnanten Ausdruck findet: «Scarificatio crurum hydropico lethalis! Und wiederum tritt ein Umschwung der Meinung ein. Hadrian Slevogt⁶⁾ (1697) tritt in einer Decanatsrede für die Beibe-

1) Schenk ius, Synops, Lib. V., Art. III., § 45.

2) Forestus, Lib. XIX., Observ. 41, Tom. II., cit. nach v. Swieten.

3) Thom. Sydenham, op. omnia. Cap. de hydrope. 1587.

4) Boerhave, Aphor. § 1242.

5) Th. Bonet. Med. collatitia, Lib. III., Sect. XXIII., Cap. LII. und LIII. 1682.

6) Hadr. Slevogt, l. c.

haltung der chirurg. Behandlungsmethode, speciell des tiefen Schnittes, ein, seine Behauptung durch casuistische Fälle von Servinus, Willisius, Frideric. Hoffmann, Purrmann, Sennert und anderen stützend. Ebenso den Schnitt der Scarification vorziehend, spricht sich der Commentator Boerhaves, van Swieten¹⁾ (1765) aus. Die trotzdem oft unvermeidliche Gangrän rath er «mit der antiseptischen Kraft der peruvianischen Rinde» zu bekämpfen. Als Ersten sehen wir ihn auch den Versuch machen, den Zusammenhang zwischen dem Kommen und Schwinden des Anafarkas und Höhlentranssudates zu erklären. Von der Thatfache ausgehend, «dafs die Gewebsspalten mit den Lymphgefäfsen und Venen in direkter Communication stehen», ist es ihm begreiflich, wie die Hautvenen das Höhlentranssudat zu resorbiren in Stand gesetzt werden, wenn sie selbst vom Drucke des Oedemes befreit sind».

Soweit die Methode der Alten. Was den curativen Effekt derselben anbetrifft, so huldigt keiner der genannten Autoren, dem optimistischen Satz des Hippokrates: *si hoc feceris cito sanum efficies*. Vielmehr wird für die Mehrzahl der Fälle nicht mehr dem chirurgischen Eingriff nachgesagt, als dafs er dem Kranken genügende Erleichterung verschafft. Es werden aber auch allenthalben in der angeführten Literatur Fälle von Heilung²⁾ verbürgt, eine Thatfache, die durchaus nicht bestritten zu werden verdient.

1) van Swieten. Comment. in Boerhavae aphorismos, § 1242. 1765.

2) Anm. Dass es sich in diesen Fällen nicht immer um eine leichtfertige Auffassung des Heilungsbegriffes gehandelt hat, möge hier noch constatirt werden. So wappnet sich Servinus (cf. Slevogt l. c.) gegen diesen etwaigen Vorwurf, indem er die Geschichte eines bereits von allen Aerzten aufgegeben Hydropischen erzählt, «qui crebro concisu singulariter levatus et ad hunc diem orco praereptus est.» Zu Zeugen dieses Falles führt er Jacob Ferrajolo, Nic. Angelo und Joh. Angel. Pandolphus an.

2. Die Acupunctur.

Vom Anfang unfres Jahrhunderts bis fast auf die Gegenwart tritt an Stelle der Incision und Scarification die Acupunctur. Die Gefahren des Schnittes erscheinen zu groß, sie werden nicht mehr riskirt; mit dem Nadelftich sucht man sie zu verringern, der Infektion auf diese Weise entgegenarbeitend.

Bright¹⁾ stiefs die Acupuncturnadel in die hydrophische Haut und drehte sie mehrmals, ihre Richtung wechselnd, um, wodurch eine grössere Anzahl Bindegewebsmaschen zerrissen werden sollten. Dieses Verfahren wird selbst noch von E. Wagner²⁾ ausgeführt, wenn auch nicht gerade empfohlen. Christison³⁾ giebt gleichfalls der Acupunctur den Vorzug vor der Scarification. Die Leistungsfähigkeit derselben stellt er der Scarification gleich, ihre Gefahr schätzt er geringer. Als Irrthum bezeichnet er Solon's Ansicht, dass Einstiche bei Wasserfucht in Folge von Nephritis selten oder niemals von Complicationen gefolgt werden, mehrere Fälle (Nr. XVI und XVII) als widerlegendes Beispiel citirend.

Eliotson⁴⁾ sehen wir die von den bisher genannten Autoren gegebene vorschriftsmässige Zahl von $\frac{1}{2}$ Dutzend Nadeln überschreiten. Er sticht 20—30 ein und will die Erfahrung gemacht haben, dass die Acupunctur über dem Knie bei Weitem die ungefährlichere ist, während unterhalb des Knies sich fast mit Sicherheit Complicationen

1) Cit. nach Malmsten l. c

2) Wagner, Ziemssen's Handb. d. spec. Path 1882. p. 122.

3) Rob. Christison, die Granularentartung der Nieren 1838 übers. v. J. Mayer, Wien 1841, p. 119.

4) J. Eliotson. The Principles and Practice of Medicine 1838, Ausgabe von Rogers cit. nach Schmidt's Jahrb. B. 34. 1842.

erwarten lassen. Er beobachtete ein gangränescirendes Erysipel, dem beide gastrocnemii zum Opfer fielen, nachdem das Leben.

Es ist daher nicht zu verwundern, wenn R a y e r ¹⁾ zum mindesten auf energische Einschränkung des operat. Verfahrens und auf eine vernünftige Indicationsstellung dringt. Er schreibt so kurz, daß ich ihn selbst sprechen lassen möchte: «Wir bedauern diese (s. u.) Zufluchtsmittel als höchst traurige erklären zu müssen; denn wo das phlegmonöse Erysipel noch nicht bestand, fahen wir es durch die Acupunctur hervorgerufen, anstatt verhütet, und wo es schon besteht, entschließen wir uns nun mit dem größten Widerwillen, die Acupunctur an den von der Entzündung fernen Stellen zu machen. Die Scarification haben wir seit langer Zeit ganz aufgegeben. Diese Zufälle, welche so häufig bei Anafarka in Folge von Nephritis albuminosa eintreten, sind bei dem von Herzkrankheiten bedingten Anafarka selten, und hier erweist sich eine derartige Entleerung des Serums häufig sehr heilsam».

Mit diesen von R a y e r gemachten Einschränkungen nicht zufriedengestellt, erklärt Z e h e t m e y e r ²⁾ — es klingt fast wie Hohn «wer bei einem Hydrops, der durch eine Herzkrankheit bedingt ist, Scarificationen vornimmt, der giebt zunächst Veranlassung zur Entstehung des gangränescirenden Erysipelas.»

Doch was half alles Verwerfen, wenn nicht ein Ersatz geschafft wurde! Wie schon betont, ist die chirurg. Behandlung der Hydropischen keine Geschmacksache des Einzelnen, von der er Gebrauch machen mag oder nicht,

1) P. Rayer, die Krankheiten der Niere, deutsch v. Landmann. Erlangen 1844. p. 262.

2) Zehetmeyer, Krankheiten des Herzens. Wien, 1845 p. 221.

sie ist eine Nothwendigkeit, zu der Jeder sich entschließen muß. Darum finden wir es begreiflich, daß auch die Acupunctur, obgleich ihre Gefahr nunmehr richtig gewürdigt ist, in Ermangelung eines besseren Verfahrens immer wieder angewandt wird. Malmsten¹⁾, Owen Rees²⁾, Johnson³⁾, Forget⁴⁾, v. Dusch⁵⁾, eine Zeit lang auch Traube und Frerichs sehen wir sie als letztes Mittel sich vorbehalten. Gegenüber den diesen chirurgischen Eingriffen zur Last gelegten Wundcomplicationen nimmt Johnson folgende Stellung ein: «Wahrscheinlich würden in einigen dieser Fälle, wo Entzündung auf die Punctur folgt, in Folge der übermäßigen Ausdehnung der Hautdecken derselbe Ausgang erfolgt sein, selbst wenn keine Punctur gemacht worden wäre, und ich glaube, daß Entzündungen der Haut viel häufiger durch Acupunctur beseitigt als herbeigeführt werden.»

Neben der Acupunctur übte Owen Rees ein anderes, geistreiches Verfahren, das er von Babington gelernt zu haben erzählt, das kurz als «subcutane Incision» bezeichnet werden kann. Es besteht darin, daß man mehrmals die Lanzette durch ein und dieselbe

1) Malmsten, d. Brightsche Nierenkrankh. übers. von v. d. Busch. Bremen, 1846 p. 167.

2) O. Rees D. Morb. Bright. übers. v. Rostok. Braunschweig, 1852, p. 69.

3) Johnson. Die Krankh. der Niere übers. v. Schütze. Quedlinburg, 1854.

4) Forget, Krankh. d. Herzens, übers. v. Wolf, Giessen 1852. p. 108.

5) v. Dusch, Herzkrankheiten. Leipzig 1868, p. 265.

Anmerkung. Wol kaum nachgeahmt ist der Vorschlag Heller's (Arch. f. phys. Chem. und Micr. 1845 H. 3 und 4 p. 217), «Wasserentziehung an hydropischen Gliedern durch Einpackungen in Chlorcalcium zu erzielen.»

gemachte Oeffnung einführt, und jedes Mal die Richtung der Spitze ändert. «Auf diese Weise gelingt es uns eine große Zahl von Zellen zu öffnen, während wir die Haut nur an einer Stelle verwunden.»

Die berechtigte Furcht vor endzündlichen Complicationen hat dann zu weiteren Modificationen der Acupunctur Veranlassung gegeben. Aug. Stöhr ¹⁾ berichtet über die Erfahrungen des Würzburger Juliushospitals, die mit Scarificationen und Punctionen gemacht wurden. Darnach «sind Scarificationen unbedingt zu verwerfen. Man bediene sich einer Punctionsmethode, welche so viel als möglich den Vorgang spontaner Eczembildung nachahmt, d. h. der Stich soll nicht tief dringen, es soll gerade nur die Epidermis abgehoben und nie der Stichkanal durch die ganze Dicke des corium oder gar bis ins Unterhautbindegewebe fortgesetzt werden.» Diese Strenge gilt besonders für Nierenkranke, während bei Hydropischen anderer Art noch Scarificationen zulässig sind. Es ist nun anzunehmen, da Zahlenangaben fehlen, daß der Effect dieser oberflächlichsten aller Acupuncturen, ein sehr minimaler gewesen sein muß, so daß dieser Vorschlag wohl kaum irgend nachgeahmt worden ist, zumal die Gefahr des Erysipels, vielleicht in gleichem Maße, fortbestehen bleibt. Wichtiger dagegen erscheint die Arbeit deshalb, weil sie einen entschiedenen Nachdruck auf die weit größere Gefahr bei Punctionen der Hydropischen *nephritide* legt. Als Grund wird die alienirte Blutbeschaffenheit präsumirt. Bei Urämischen soll daher jeder operative Eingriff strengstens ausgeschlossen sein, indem dem im Serum befindlichen Harn-

1) Stöhr. Verhandlg. d. phys.-med. Ges. Würzburg. Neue Folge. I. 1872. p. 202.

stoffe die größte Reizungsfähigkeit der Haut gegenüber zugesprochen wird. Von diesem Gesichtspunkte aus wurde 5 Mal auf Harnstoff untersucht, und dabei 1,25, 1,35, 1,85, 0,95 und 2 % salpeterf. Harnstoff im Hautwasser gefunden; (übrigens vermag ich selbst an die annähernde Richtigkeit dieser Zahlen nicht zu glauben, da sie zu sehr mit späteren Bestimmungen contrastiren).

In den deutschen Kliniken hat die Acupunctur indess bald ausgespielt. Von Traube werden anfangs wieder die oberflächlichen Scarificationen, später, einige Linien tiefe und lange Einschnitte, wenig an Zahl, von Ziemssen der «tiefe Schnitt» empfohlen. Der Unterschied der beiden letzteren Arten ist nur ein quantitativer: sie einen sich im Bestreben die Gefährlichkeit der multiplen Scaricatorwunden zu umgehen. Und damit ist zu den Methoden der Alten zurückgekehrt worden.

Es ist sehr zu bedauern, daß keiner der genannten Autoren bisher seine Erfahrungen in der unwandelbaren Gestalt der kasuistischen Zahl ausgedrückt hat, vielmehr waren es allgemein gehaltene Bekenntnisse, die ich soeben referirte. Daher ist es nur möglich, die Erfahrungen dieses großen Zeitabschnittes in allgemeinen Sätzen zusammenzufassen:

«Scarification, Incision und Acupunctur schaffen dem Hydropischen noch dann Erleichterung, wenn interne Mittel bereits versagen; in geeigneten Fällen ist ihr therapeutischer Nutzen ein weit größerer, ja Heilung ist sogar durch sie möglich;

«dem Hinzutreten von Erysipel und Gangrän bieten sie annähernd gleiche Chancen;

«jedes andere mechanische Mittel ist absolut verwerflich.

«Die Paracentesis cutis bei Nierenkrankheiten ist häufi-

ger von Erysipel gefolgt als bei andren Krankheiten und ist dieses durch die alienirte Blutbeschaffenheit zu erklären.

«Die operative Behandlung beugt dem Spontanerysipel und der Spontongangrän vor.»

3. Die Drainage mit dem Troikart.

Nach dem bisher Gefagten ist es erklärlich, daß das Bedürfnis nach einer das Erysipel und die Gangrän ausschließenden Methode nach Jahrhundert lang gemachter schlechter Erfahrung mit den bisherigen, berechtigter war als je. Die Mängel der alten lagen eben darin, daß der Abfluß des Wassers aus den gesetzten Continuitätstrennungen gebunden war an das Prinzip der offenen Wundbehandlung. Wunde, Effekt und Infektionsmöglichkeit stehen in gerader Proportion. Das Wasser beriefelt die Haut und wirkt so als Reiz auf sie; Bett und Leibwäsche werden durchnäßt, die Wunden heilen nicht per primam, weil nachsickerndes Wasser sie offen erhält. Mit den Anschauungen, die wir von Lister gelernt haben, ist es nun unvereinbar solche Zustände an der zur Entzündung an sich schon neigenden Haut eines Nephritikers zu schaffen; mit dem Zweck eines zielbewußten Handelns wäre es aber gleich unvereinbar die Wunden unter Lister zu setzen, wie es Ziemssen eine Zeitlang versucht hat. Dadurch wird dann allerdings der beabsichtigte Effekt der Incision illusorisch. Bei einer Nachahmung dieses Verfahrens fand Sigg¹⁾ in einem Falle, nach 24 Std. Verlauf, statt des erhofften Wasserabflusses, «den Verband trocken und die Wundfläche mit faserstoffartigem Gerinnfel bedeckt.» Der Tod unterbrach die eben eingeleitete Verheilung.

1) Correspondenzbl. f. Schweiz. Aerzte 1879.

Unter solchen Umständen muß man es als einen glücklichen Gedanken bezeichnen, daß die Pravaz'sche Canüle als das geeignete Instrument erkannt wurde, um den Uebeln des chirurg. Schnittes standhaft gegenüberzutreten zu können. A priori sind die Vortheile dieser Methode, welche Drainage genannt zu werden verdient, sehr große: sie schafft eine minime Hautwunde; gestattet das Wasser so abzuleiten, daß weder Haut noch Wäsche benetzt werden; gestattet das Anlegen eines antisept. Verbandes während des Abflusses; und sichert durch geeignete Mittel vollkommenen Verschluss der Wunde, so daß das verderbliche Nachsickern inhibirt wird — kurz, sie vermeidet sicher die Gefahr der Infection.

Die Pravaz'schen Canülen sind indess bald verlassen: da sie aus Stahl gearbeitet sind, rosten sie leicht und wirken dadurch reizend; sie verstopfen sich leicht mit Blutgerinnseln oder Gewebefetzen, oder ihre Oeffnung wird durch daran sich legendes Gewebe, besonders Fett verlegt. Ihr Effect ist also unter Umständen klein oder gleich Null. Nothwendig ist es auch sie in größerer Anzahl¹⁾ zu verwenden, was neue Nachtheile mit sich bringt: der Patient wird äußerst belästigt, da er bei Application einer großen Anzahl zur absoluten Ruhe gezwungen ist und die Möglichkeit der Complicationen, die noch immer nicht ganz ausgeschlossen ist, wird vermehrt.

Auch die von Bock²⁾ in der Frerichs'schen Klinik eingeführten gröberen Stahlcanülen besitzen noch einen Theil der geschilderten Nachtheile; hier wird die

1) So sah Wolf sich veranlasst, bei einem seiner Kranken 25 Pravaz'sche Canülen zu appliciren. Berl. kl. Wochenschr. 1872 Nr. 14.

2) Reichert - Dubois Arch. 1873, p. 620. cfr. II. Congress Wiesbaden p. 204.

Drainage bereits methodisch geübt. Ueber die auf der Traube'schen Abtheilung gemachten Erfahrungen berichtet Stricker ¹⁾, «während in Privathäusern zur Beseitigung hochgradiger Oedeme der Nephritiker allenfalls Incisionen in die gespannte Haut gemacht werden können, muß man in Krankenhäusern davor warnen und wer ein paar Mal schnell tödtende gangränescirende Erysipele nach denselben gesehen hat, läßt gern von selbst die Hand davon . . . Auf der Traube'schen Klinik sind deswegen eigene an den Rändern mit kleinen runden Oeffnungen versehene, lange dünne Troicarts in Gebrauch, welche ausgekocht und carbolisirt eingestochen werden. Der Wasserabfluß aus den an ihnen befestigten Gummischläuchen, geht schnell und gut von Statten. Beispielsweise floß durch eine solche durchbrochene Canüle bei einem Nephritiker im Laufe von 6 Tagen 17,200 Cubm. ab . . . Noch weit überraschender war der Erfolg in einem Falle von Hydrops in Folge von Nierenamyloid. Hier floß aus 2 Canülen im Verlaufe von 30 Stunden 16,500 Ccm. Wasser ab . . . Ich kann versichern, daß Erysipele bei einem solchen Verfahren, selbst dann, wenn andere daran leidende Personen in demselben Krankensaal liegen, sehr selten sind.»

Nächst Stricker hat Ganghofer ²⁾ gleiche günstige Beobachtungen aus der Bonner Klinik publicirt. Zur Verwendung gelangte ein Explorativtroikart, der mit einem das Wasser ableitenden Schlauche armirt wurde.

Vielleicht die größte Popularität hat sich der Capillary Drainage Trocar Southey's ³⁾ erworben, der 1877 auf dem

1) Charité-Annalen 1874, p. 317. Berlin 1876.

2) Böhm. Centralblatt 1875, Nr. 26 p. 158.

3) Transactions de l'Association franç. pour l'avancem. d. sciences. Congrès du Nêvre 1877.

Congress zu Nàvre über die von ihm gemachten Erfahrungen und Erfolge berichtet hat. (Leider waren mir diese Mittheilungen nicht zugänglich.)

Einige Jahre später hat Sigg¹⁾, wie mir scheint, ohne von den Southey'schen Troikarts Kenntniss gehabt zu haben, einen eignen Troikart construirt, da die Pravazsche Nadel ihn zu oft im Stich gelassen; derselbe ist 9,5 Cm. lang, 1,5 Mm. dick, aus Neufilber, gefenstert, gebogen wie eine chirurg. Nadel, und wird so hinein gestossen, dass er die Haut zwei Mal durchlocht. Das Ende, das die Spitze trägt wird mit einem Spitzendecker verschlossen, das andere mit dem Schlauch armirt. Es ist keine Frage, dass in der doppelten Durchlochung der Haut ein grosser Fehler in der Construction desselben liegt.

Der II. Wiesbadener Congress brachte eine neue Mittheilung. K l a a t f c h²⁾ bediente sich platter Canülen, die er zur Vermeidung jeder Oxydation aus Gold anfertigen liess. Er versichert keinerlei Infektionsercheinungen erlebt, dagegen „bei einigen Kranken mit entzündlicher Nephritis vollständige Heilung erzielt zu haben.“ Interessant ist diese Mittheilung besonders dadurch, dass sie, an den Vortrag L e u b e s über die Behandlung der Urämie in der Discussion anknüpfend, die Drainage der Oedeme als P r o p h y l a x e gegen Urämie verwerthet wissen will, ein Vorschlag, der unbeanstandet blieb.

Demnach scheint auf Kliniken im Allgemeinen das Princip der Drainage sich das Bürgerrecht erworben zu haben. So arbeitet das M ü n c h e n e r Krankenhaus seit Jahren mit dem Southey'schen Troikart. Das dort gewon-

1) l. c.

2) II. Congress, Wiesbaden p. 204.

nene casuistische Material ist von K o p p ¹⁾ in einer sehr verdienstvollen Arbeit zusammengestellt worden, deren Resultate ich mir in Kürze wiederzugeben erlaube.

„Unter 28 zu verschiedenen Zeiten bei 17 Patienten vorgenommenen Punktionen mit dem Southey'schen Troikart hatte man 17 Mal eine ansehnliche Menge Serum (zwischen 1—10 Liter) entfernen können, wodurch die Patienten wesentlich erleichtert wurden. Ohne jede Reaktion von Seiten der Punktionsstelle blieben 20 Fälle; 4 mal folgte leichtes Erysipel mit circumscripter Gangrän, in 4 Fällen verbreitete sich das Erysipel auf weitere Strecken und mag demselben eine Beschleunigung der Lethalität zugeschrieben werden.“

„In der Regel wurden 4 Canülen auf einmal eingelegt — so daß bei den 17 Patienten 85 Canülen zur Verwendung kamen und wurden dieselben 24 Stunden liegen gelassen. Durch diese 85 Canülen wurden binnen 750 Stunden 62,500 Ccm. Serum entleert. Aus einer Durchschnittsberechnung ergibt sich, daß aus 4 Drainagen bei 24 stündigem Liegenbleiben circa 2000 Ccm. entleert werden.“ In einer nachträglichen Statistik von 11 Fällen, wobei 30 Punktionen mit 107 Canülen gemacht wurden, kam es 8 mal zu entzündlichen Complicationen.

Diese Resultate, wenn sie auch um vieles glänzender sind als die der alten Methoden, der Incision und Scarification, lassen dennoch eine große Befriedigung nicht zu. Daher sagt auch K o p p trotz allen Lobes, daß er im Allgemeinen der Methode zollt: „der Erfolg ist oft minimal und Erysipel und Gangrän treten doch auf. Wieviel daran

1) Annalen der städt. allgm. Krankenhäuser zu München 1876 und 1877. München 1881 p. 550.

eine noch mangelnde Technik Schuld trägt, insbesondere was die Nachbehandlung derartiger Punktionen betrifft, das muß die Zukunft lehren.“ Wir werden später diesen Fragen näher treten.

4. Die Trichterdrainage Straub's ¹⁾.

Schon vor Straub hatte Mader ²⁾ versucht, den alten chirurg. Schnitt aseptisch zu erhalten, ohne den Abfluß zu beeinträchtigen. Die Verunreinigung der Wunde sollte in der Weise ausgeschlossen werden, daß ein mit Ung. simpl. bestrichenes Guttaperchapapier, die Wunde bedeckend, an drei Seiten mit Heftpflaster geschlossen wurde, während die 4., als tiefste, offen blieb. Wenn nun auch grobe Verunreinigungen dadurch verhütet erscheinen, so ist die Infectionsmöglichkeit der Wunde nicht im mindesten eingeschränkt, da ja der Luft der Transport der Infectionskeime vindicirt werden muß.

Mit der Aussicht absoluter Asepsis scheint dagegen das Verfahren Straub's construirt zu sein, das einem glücklichen Zufall seine Entstehung verdankt, und das von ihm Trichterdrainage bezeichnet worden ist. Seit 5 Jahren ist es auf der Tübinger Klinik üblich, die neuesten Lehrbücher registriren es mit lobender Beurtheilung. Da es in dem leicht zugänglichen Lehrbuche Liebermeister's umständlich beschrieben wird, begnüge ich mich, daselbe nur kurz zu skizziren: Auf eine unter antisept. Cautelen gemachte Incision wird ein mit antisept. Flüssigkeit gefüllter,

1) F. Straub, Beitrag zur operat. Behandl. d. Oedeme d. Haut. Diss. Tübingen 1882; Liebermeister, Vorl. über spec. P. und Th. II. p. 267. 1887. Centralbl. f. kl. Med. 1882. Nr. 25.

2) Bericht d. k. k. Krankenaustalt Rudolph-Stiftung. Wien. 1875.

kleiner Glastrichter aufgesetzt, der mit einem ableitenden Schlauch versehen ist. Das Ende des Schlauches taucht in Carbollösung und wird während des Aufsetzens hoch gehalten. Senkt man dann daselbe, so wird durch das Gewicht der im Schlauch und Trichter befindlichen Flüssigkeitsfäule die Haut in den Trichter hineingezogen, der Trichter bleibt haften und der Abfluß geht von Statten. Ob nun dieses Verfahren den Vorzug größerer Leistungsfähigkeit und geringerer Gefahr vor der Drainagemethode voraus hat, werden spätere Auseinandersetzungen lehren.

III. Eigenes casuistisches Material.

Das mir zu Gebote stehende casuistische Material umfaßt die Krankheitsgeschichten von 35 Patienten, welche vom Jahre 1880 bis auf die Gegenwart im Rigaschen Stadtkrankenhaus Aufnahme gefunden hatten. 7 weitere Fälle stammen aus der Privatpraxis Dr. Hampeln's, der sie mir gefälligst zur Verfügung stellte. Ich selbst hatte die im I. Sem. 1889 behandelten Patienten zu beobachten die Gelegenheit.

In diesen 8 $\frac{1}{2}$ Jahren kamen die verschiedensten Methoden der chirurgischen Hautwassersuchtbehandlung zur Anwendung: Scarification, tiefer Schnitt, Straub's Trichterdrainage, Drainage nach Southey.

Um nicht meiner Arbeit durch ein Referat der bezüglichen Krankheitsgeschichten eine unnütz grofse Ausdehnung zu geben, glaube ich mich begnügen zu dürfen, die zusammengehörenden Fälle tabellarisch ordnend, nur das Wesentlichste mitzutheilen. Die Vorzüge und Nachtheile der einzelnen Methoden werden sich auf diese Weise am prägnantesten repräsentiren und am leichtesten mit einander vergleichen lassen. Uebereinstimmend mit der eingangs ausgesprochenen Absicht dieser Arbeit, werden als besondere Vergleichspunkte die mit den einzelnen Methoden verknüpfte Zahl der Wundcomplicationen einerseits, ihr Effect in technischer und curativer Hinsicht

andererseits zu gelten haben; diesen Gesichtspunkten sind daher besondere Rubriken angewiesen.

Das ganze Material ist in folgender Weise gruppiert worden:

Tabelle 1 handelt die mit Incisionen und Scarificationen behandelten 16 Fälle ab.

In Tabelle 2 ist Straub's Trichterdrainage vertreten. Die eigene Casuistik von 10 Fällen wird durch 4 Fälle Straub's, welche er in seiner Dissertation veröffentlichte, completirt.

In den Tabellen 3 und 4 sind die nach dem Drainageprincip behandelten Fälle wiedergegeben. In ersterer habe ich die mit dem Southey'schen Troikart behandelten 16 Fälle zusammengestellt und sie durch eine Casuistik Kopp's und Straub's vermehrt; in letzterer finden sich die nach der gegenwärtigen im Rigaischen Krankenhause geltenden Methode und Technik behandelten 12 Fälle gruppiert. Warum eine derartige Abtrennung stattfand, darüber wird an einschlägiger Stelle Rechenschaft gegeben werden.

I. Incision und Scarification.

Da vom chirurgischen Standpunkte Incision und Scarification zusammengehören, fand ich es auch nicht notwendig, die nach diesen Methoden behandelten Fälle getrennt abzuhandeln. Beide Methoden stehen auf dem Princip der offenen Wundbehandlung und werden demnach der Infection gleiche Chancen bieten. Ihre verschiedene Leistungsfähigkeit, wodurch sie sich wesentlich unterscheiden, findet späterhin eingehendere Berücksichtigung.

Tabelle I.
Incision und Scarification.

Name u. Datum.	Krankheit.	Fingriff.	Nachfolgende Complication.	Effect und Bemerkungen.
1. Otto Kurme 68 a. n. Aufgenommen: 10. III. † 27. III. 87.	Stenos. ost. v. sin. (Fettleber Infarct. pulm. Atroph. re- num) Oedeme mit- leren Grades an den Unterextremitäten.	16. III. Incision am linken Unter- schenkel.	25. III. Erysipel von der Incisionsstelle ausgehend, T° steigerung bis zum Tode.	Grosse Wasserentleerung. Bis zum Auftreten des Erysipels grosse subjective und objective Erleichterung.
2. Benzel Hirsch- berg 65 a. n. 27. II. — 11. V. 87.	Emphys. pulm. Allgem. Anasarca bes. d. Unterex- trem u. Genitalien.	20. III. 2 Incision- en, an jedem Malleolus eine.	Keine.	Anm.: wird später in extenso referirt.
3. Anna Mant- schewitz 47 a. n. 8. VII. — 24. VII. 87. †	Insuff. v. mitral. (Degen. cordis.) Hydrops univer- sal.	13. VII. Incision am rechten Unter- schenkel.	19. VII. Erysipel von d. Incisionsstelle aus- gehend. T° 40. Schüttelfrost.	Die Oedeme der Unterextremitäten sind so hochgradige, dass am 12. VII. Spontanruptur der Haut des rechten Unterschenkels erfolgte. Der Effect der Incision war ein ausgezeichneter. Die Diu- rese hob sich von 500 Ccm. auf 2000. (19. VII.) Mit dem Auftreten des Ery- sipels stellte sich Cyanose, Herzschwäche und Collaps ein.
4. Carl Braun 35 a. n. 20. V. — 7. IX 87.	Insuff. v. aortae Hydrothorax, As- cites. Anasarca univers.	27. V. Incision am linken Unter- schenkel. 28. V. Incision am rechten Unter- schenkel.	11. VI. Erysipel am l. Unterschenkel. 16. VI. Erysipel am r. Unterschenkel von den Incisionswun- den ausgehend. Das Erys. wird gangränescirend.	Nach der Incision manifestirte sich die bis dahin ausgebliebene Digitaliswir- kung. Am 2. VI. war ein Spontan- ruptur der Scrotalhaut eingetreten, der ein gangränescirendes Erysipel folgte Während der Abfluss aus den Wunden gut von Statten geht, wird Digitalis und Calomel weiter gebraucht. Pat. überstand das Erysipel und wurde gebessert, frei von Oedemen und Hydropsien entlassen.

Nr.	Anm.: wird später ausführlich referirt.	Keine.		Anm.: wird später referirt werden.
		2 Incisionen (am r. Untersch. und dors. ped.)	2 Incisionen (am l. Untersch. und malleolus.)	
6.	Dr. A.* 50 a. n. †	Arterioscl. univ. Myocarditis. (Nephritis.)	2 Incisionen am r. u. l. Unterschenkel je eine.	Erysipel und Gangrän, von den Incisionswunden ausgehend.
7.	Peter Sidorow 45 a. n. 2. V 86. †	Myodeg. cordis Arterioscleros. univ. Anasarca d. Unterextrem. und der Genitalien.	26. IV. Scarificatio penis.	Bis zum Tode (6 Tage) kein Erysipel.
8.	Kusma Sowastjanow 35 a. n. 13. IX — 30. IX 86. †	Insuf. v. aortae. Anasarca univers.	17. IX. Scarificat scroti.	Keine.
9.	Joh. Fischer 40 a. n. 21. VII — 12. X 86. †	Insuf. v. mitral. Sten. ost. v. sin. Anasarca d. Unterextrem. und der Genitalien.	9. X. Scarificat praeputii.	Bis zum Tode (3 Tage) kein Erysipel.
10.	Abramowitsch Weiss 19 a. n. 9. I — 27. I 85. †	Insuf. v. mitral. Stenos. ost. v. sin. (Tubercul. pulm.) Hydrops univers.	18. I. Scarif. scroti. 21. I. Scarif. scroti.	23. I. Gangrän des Scrotums, auf den Penis übergehend.
11.	Grigori Sidortschick 38 a. n. 1. VII — 21. XI 85.	Insuf. v. aortae. Anasarca d. Unterextrem.	2. VIII. Scarification beider Unterschenkel.	7. VIII. Gangränesc. Erysipel beider Unterschenkel.

Das Erysipel ging v. d. Stichcanälen aus und verbreitete sich fast über den ganzen Unterschenkel. Tiefe Gangrän. Am 28. VIII stossen sich die gangränösen Theile ab, am 1. X bilden sich Granulationen. Wasserbad, Sublimat. Gebessert entlassen.

Geringe Erleichterung.

Kein Effect.

Grosse subj. Erleichterung. In 2 Tagen konnten 5600 CC. Anasarcaflüssigkeit aufgefangen werden.

Subj. Erleichterung.

N ^o	Name u. Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Nachfolgende Complication.	Effect und Bemerkungen.
12.	Bernhard Schmähmann 49 a. n. 30. I — 4. III 81.	Mr. Brightii. Anas. univers.	4 II. Scarif. scroti.	Keine.	Pat. wird, fast frei von Oedemen, die namentlich an den Geschlechtstheilen hochgradig gewesen waren, entlassen. Der Effect der Scarif. war reichlich.
13.	Jannot Bau- mann 10 a. n. 8. I — 18. I 81.	Mr. Brightii. Anas. univers.	Pat. ist in der Privatpraxis am scrotum scarificirt worden.	9. I. Nachts Schüttelfrost, Temperatursteigerung. Erysipel, tiefgreifende Nekrose, Fistelbildung.	Gebessert entlassen.
14.	Max Schiffer 35 a. n. 8. III — 26. III 80. †	Mr. Brightii. Anas. univers.	23. III. 16 flache Schröpfköpfe.	Bis zum Tode (4 Tage) kein Erysipel.	Das Wasser floss reichlich bis zum Tode ab.
15.	Henne Kontor 26 a. n. 13. VI — 9. VII 80.	Mr. Brightii. Anas. univers. bes. d. Unterextremit.	28. VI. Mehrere Schröpfköpfe an den Unterschenkeln.	Bis zum Tode (11 Tage) kein Erysipel.	Reichlicher Ausfluss.
16.	Herr W. *) 50 a. n.	Myocarditis. (Neph. inter stitialis.) Anasarca bes. d. Unterextremit.	Schröpfköpfe.	Erysipel. gan- grän.	(ante Entleerung.

Die Incisionswunden wurden unter antiseptischen Cautelen angelegt, 3 ctm. lang und so tief, daß das Unterhautzellgewebe fast durchsetzt wurde. Durch Bindencompression versuchte man den Abfluß zu beschleunigen und zu vergrößern.

Zur Ausführung der Scarificationen bediente man sich der Venaefectionslancette, in einigen Fällen scharfer Schröpfköpfe.

Sobald die Entleerung des Wassers zu versiegen begann, was bei den Incisionen in einigen Fällen erst nach 4—6 Wochen stattfand, wurde unter einem antiseptischen Verbands Verfluß und Heilung der Wunden angestrebt. Letzteres war, namentlich nach dem tiefen Schnitt, oft erst mit vieler Geduld erreichbar. Während des Fließens trug man, durch häufigeerspülung mit antiseptischer Flüssigkeit für die Reinerhaltung der Wunde Sorge.

Das Refumé der vorangestellten Tabelle belehrt nach zweierlei Richtung:

1) Hinsichtlich der Complicationen ist den auf dem Principe der offenen Wundbehandlung beruhenden chirurgischen Eingriffen die schlechteste Prognose zu stellen. Von 16, theils mit Incisionen, theils mit Scarificationen behandelten Patienten bekamen 8 Erysipel, und zwar trat dasselbe meist in seiner gangränescirenden Form auf. Fast scheint es, als ob die Incisionen in dieser Hinsicht noch schlechter gestellt sind, als die Scarificationen. Ich glaube, daß die Complicationsziffer eine noch größere geworden wäre, wenn bei einem Theil der vom Erysipel freigebliebenen Patienten nicht der Tod einem eventuellen Erysipel zugekommen wäre. In der Hälfte der Fälle werden demnach die mit Incisionen und Scarificationen behandelten Pa-

tienten von schweren Wundcomplicationen betroffen.

2) Hinsichtlich des Effectes sind Incision und Scarification in einer viel bestimmteren Weise auseinander zu halten.

Die Scarificationen hatten nie mehr als subjective Erleichterung zur Folge; dieses bezweckend, wurden sie daher auch meist an jenen Theilen geübt, deren hydropische Schwellung dem Patienten bekanntlich die grösste psychische Beunruhigung und physische Belästigung bereitet — am scrotum, penis und präputium.

Die geringe Leistungsfähigkeit der Scarificationen einerseits, die mit ihnen verbundene grosse Gefahr andererseits, lassen sie somit als einen absolut verwerflichen Eingriff erscheinen. Die später zu beschreibende sehr leistungsfähige und ungefährliche Drainagemethode muß sie in Zukunft vollauf ersetzen.

Dem tiefen Schnitt hingegen, wie er von Ziemsfen in die Praxis eingeführt wurde, kommt in geeigneten Fällen eine ganz andere Bedeutung zu. Die durch ihn bewirkte Entleerung ist eine so ausgiebige, daß dadurch thatsächlich ein curativer Nutzen geschaffen wird. Diesen curativen Erfolg denke man sich dadurch zu Stande kommen, daß durch die gründliche Entleerung des Hautwassers ein bedeutendes Circulationshinderniß fortgeschafft wird. Die Herzarbeit wird dadurch entlastet, das Herz erholt sich, es wird für die medicamentösen Herzmittel wieder zugänglich; diese, vor der Entleerung der Oedeme, wirkungslos, beginnen wieder zu wirken. Die ohnmächtige interne Therapie, das ist der Zweck der tiefen Incision, soll wieder zu Kräften kommen. — Ehe diese Anschauungen theoretisch weiter begründet

werden, theile ich einige Krankheitsgeschichten mit, welche geeignet erscheinen, diese Anschauungen zu einer Erfahrungsthatsache zu erheben. Besonders möchte ich dem 2. Fall, Frau B., eine besondere Beweiskraft zuschreiben.

I. Benzel Hirschberg (Tab. I. Nr. 2) 65 a. n. trat am 27. II. 87 in die Behandlung des Krankenhauses. Seit 10 Jahren leidet er an Husten mit reichlichem Auswurf, Kurzathmigkeit und Herzklopfen. Seit 6 Wochen bestehen allgemeine Oedeme, die an den unteren Extremitäten und am Scrotum besonders hochgradig sind.

Stat. praesens 28. II. Pat. ist schlecht genährt. Es besteht Cyanose, Dyspnoe und Oedem der Haut, besonders an den Unterextremitäten und am Scrotum.

Die Lungengrenzen sind stark erweitert, die Auscultation weist weit verbreiteten Catarrh nach. Der Herzchok ist nicht fühlbar, die Dämpfungsfigur fehlt, die Töne sind sehr schwach, doch rein. Der Puls ist klein, weich und beschleunigt. — Die Leber reicht bis zum Nabel, Ascites ist nicht nachweisbar. — Die Milz ist vergrößert. — Der Harn ist klar, ohne Albumin, 1021; Tagesquantum 100.

Versuchsweise, doch ohne Erfolg wurde zunächst Adonis gegeben. Ehe jedoch weitere und energischer wirkende Herzmittel angewandt zu werden verdienten, was bei der großen Herzschwäche des Patienten ein ausichtsloser Versuch gewesen wäre, wurde zunächst, conform mit den oben entwickelten Ansichten, an eine mechanische Beseitigung der Oedeme gedacht, um das Herz zu entlasten.

Am. 2 III. wird am stark geschwollenen Scrotum der Straub'sche Trichter aufgesetzt, durch den innerhalb 4 Tage 4800 Ccm. und in weiteren 2 Tagen 1200 Ccm. Serum entleert werden. Die folgenden Gaben Adonis und Digitalis beginnen zu wirken: Cyanose und Dyspnoe schwinden, die Oedeme werden geringer, der Puls wird besser. Dieser Erfolg ist indess nicht dauernd, die Beschwerden kehren allmählig wieder.

Am 20. III. werden, da die Oedeme wieder zunehmen, 2 Incisionen unter den Malleolen gemacht, worauf ein reichlicher Abfluß von Serum bis zum 20. IV. erfolgt, d. h. während eines ganzen Monats. Indem gleichzeitig Adonis, Digitalis und Aloe gereicht werden, wird eine auffallende Besserung erzielt: Cyanose, Dispnoe und Oedem schwinden wieder, die Respiration wird ruhiger, das Rasseln verschwindet, Husten und Auswurf werden spärlich, der Puls erhält das Prädicat recht gut und die Harnmenge hebt sich gradatim von 300 auf 1900 und verbleibt durchschnittlich 1500. Am 11. V. konnte Patient relativ genesen entlassen werden.

Etwa nach einem Jahr kam Patient wieder; bis dahin hatte er sich vollständig wohl gefühlt und gearbeitet. Oedeme fehlten. Er war an einer fibrinösen Pneumonie erkrankt, der er auch erlag.

Die Section ergab: Synechia pleurae rechts, Emphysema pulm.; Dilatatio et Hypertrophia v. dextr., Pneumonia sin. totalis.

Epicrise:

Nach der obigen Schilderung vermag ich die durch die mechanische Entleerung des Hautwassers hervorgerufene eclatant günstige Beeinflussung des ganzen Krankheitsverlaufes nicht zu bezweifeln. Zwar war der Erfolg, der durch die Entleerung der ersten 6 Liter geschaffen wurde, von nur vorübergehender Dauer, dennoch war er deutlich sichtbar.

Durch weiteren, einen Monat dauernden Abfluß wurde das Herz schliesslich entlastet, es fand Zeit, sich zu erholen und konnte dann erfolgreich in Anspruch genommen werden. Dieses erscheint durch den Verlauf der Diurese bestätigt. Lange bleiben die Herzmittel wirkungslos, so dafs vom 20. III. bis 10. IV. das Tagesquantum zwischen 200 und 300 Ccm. schwankt; dann aber, nachdem durch die massen-

hafte Entleerung, durch die fast vollständige Beseitigung der Oedeme ein curativer Nutzen erreicht worden war, und das Herz Zeit zur Erholung gefunden hatte, findet vom 10. IV. an gradatim eine Steigerung der Diurese statt, die am 20. IV. 1700, am 27. IV. 1900 Ccm. beträgt.

Das Oedem, als hartnäckiges und bedeutendes Circulationshinderniß repräsentirt eine große Gefahr fürs Herz. Wenn man sich dessen bewußt bleibt, dann wird man auch in Fällen, wie der obige, leicht davon absehen, von einem erlahmenden Organ eine erhöhte Arbeitsleistung zu fordern; vielmehr wird es Pflicht sein, eine rationelle Therapie mit Entlastungsmafsregeln zu beginnen.

Noch klarer möchten diese Verhältnisse durch folgenden Fall illustriert werden:

2. Frau B. 70 a. n. (Tab. I Nr. 5), leidet seit Jahren an allgemeiner Lipomatosis und den Erscheinungen der Herzschwäche in Folge von Fettherz. Athemnoth, Neigung zu Bronchialcatarrhen und Dyspepsie bestehen fortwährend. Im Febr. 1887 steigert sich die Athemnoth; Patientin kann nur sitzend sich erhalten, nur sitzend schlafen. Es haben sich Oedeme der Beine und der Bauchdecken eingestellt, die rapid zunehmen.

Bei der Consultation wurde constatirt:

Athemnoth, Cyanose, verbreitetes Bronchialraffeln, schwacher, aber regelmäfsiger Puls; hoher Zwergfellstand, der Leib stark ausgedehnt, der Schall leer, Fluctuation im Uebrigen nicht nachweisbar.

Digitalis, Adonis, Senna, Calomel, in den üblichen Gaben gereicht, haben gar keinen Erfolg. Die Diurese bleibt 200—300 Cc. pr. die, der Harn ist saturirt.

Eine Punction des präsumirten Ascites mißlingt, wegen übermäfsiger Dicke der Bauchdecken.

Darauf werden *ex indicatione vitali* 2 Inci-

sionen, am rechten Unterschenkel und Fußblatt, 3 Cm. lang, nach Eisapplication gemacht. Das Wasser strömte dem Schnitt entgegen. Die in 24 Stunden entleerte Menge kann auf ca. 10 Liter geschätzt werden. Tags darauf große subjective Erleichterung; es werden sofort 2 weitere Incisionen am linken Unterschenkel gemacht. Der Erfolg ist ein gleicher. Die Dyspnoe schwindet. Der Wasserabfuß dauerte nun ca. 6 Wochen, während dessen das obige therapeutische Regime zur Anwendung kam. Die Harnmenge begann nach einiger Zeit continuirlich zu steigen. Patientin führte selbst Buch über die mit dem Cylinder gemessene, täglich wachsende Urinentleerung, begeistert durch den Erfolg. Trotz eines leichten, fieberfreien Erythems, das kurze Zeit zu den Wunden hinzutrat, heilten diese gut und rasch.

Seitdem befand sich Patientin wohl, vollständig befreit von ihrer Athemnoth und den übrigen Erscheinungen der Herzschwäche. Der Puls war kräftig geworden, der Zustand des Herzens ein überaus zufriedenstellender.

Ungefähr ein Jahr darauf stellten sich die alten Beschwerden wieder ein. Die Herzmittel blieben wieder erfolglos und ehe die bereits vorbereitete Incision abermals vorgenommen werden konnte, trat am 7./11. 1888 plötzlich der Tod ein, in Folge von Herzschwäche.

Die Section des Herzens, welche man allein gestattete, ergab: Masse 10, 15, $5\frac{1}{2}$ mürbe Consistenz; auf der Vorderfläche Fettablagerungen bis zu 1,0 Cm. Dicke. Die Musculatur, besonders des r. Ventr. atrophisch, durch Fett theilweise verdrängt, Papillarmuskeln gelblich gefleckt, Klappen normal, Coronarart. normal; geringe Verkalkung der Aorta.

Epierife:

Nach dem früher Gesagten deutet sich dieser, wie ich glaube, höchst lehrreiche Fall, ganz von selbst. Er zeigt wiederum, wie vergeblich es ist, ein erlahmendes Herz zu

erhöhter Arbeitsleistung anhalten zu wollen, wie nothwendig dagegen es ist, zuerst dasselbe zu entlasten, ihm Ruhe zu gönnen, seine Erholung abzuwarten und dann erst mit neuen Ansprüchen heranzutreten. Dafs diese Ideen bei einem so vorgeschrittenen Zustande eines in fettiger Degeneration befindlichen Herzens nicht anders als durch die mechanische Beseitigung der enormen Circulationshindernisse realisirt werden konnten, bedarf keiner Discussion. An sich ist dieselbe, als directe Methode, die schonendste aller Entlastungsmafsregeln.

So lehrt denn der Fall, welch' ein energisches Hilfsmittel wir in der Incision besitzen; trotzdem müssen wir es bedauern, kein dauerndes Zutrauen zu ihr fassen zu können, was die ff. Krankheitsgeschichte ¹⁾ beweisen möchte.

3. Dr. A....., 50 a. n. (Tab. I Nr. 6), war 5 Jahre, bevor er in meine Behandlung trat, zum ersten Mal von einem heftigen cardialen Asthma ergriffen worden, dennoch ging er seinem anstrengenden Berufe als Leibarzt weiter nach. Im Frühling 1887 bestand bereits continuirliche Dyspnoe geringen Grades und traten zum ersten Mal Oedeme der Unterextremitäten auf. Um diese Zeit erfolgte die Consultation.

Anämie, starkes Oedem der Unterextremitäten. Hypertrophie des linken Ventr. Arteriosclerosis universal. Dilatation der Aorta ascend., systolisches Aortengeräusch; Puls mittelftark, regelmäfsig. Normaler Lungenbefund. Leber- und Milzschwellung. Kein Höhlentranssudat. Der Harn enthält Eiweifs und Cylinder. Verdauung und Appetit stets gut gewesen.

Diagn.: Myocarditis, Nephritis.

Die Oedeme steigerten sich; Herzmittel richteten im Ganzen wenig aus; die Harnmenge bleibt durch-

¹⁾ Dr. Hampeln hatte die Güte, mir das nachstehende wörtliche Referat zu überlassen.

schnittlich 700 Ccm. Chinin, Eisen, Arg. nitr. als Tonica. Späterhin, als die Beschwerden wuchsen und sämmtliche versuchten Herzmittel nicht verschlugen, gelangte Calomel zur Verwendung, welches jedoch statt eines Erfolges nur Salivation hervorrief. Die Athemnoth wird unerträglich; die Nacht wird auf dem Lehnstuhl schlaflos verbracht. Das unförmig hydrogische Scrotum bereitet heftige Qualen. Eine Punction desselben mit der Lancette schafft große Erleichterung, beseitigt aber nicht die Athemnoth. Am 20. IV. athmatischer Anfall, Herzschwäche.

Schon ehe die Dyspnoe aufs Aeufserste gestiegen war, wurde wegen Erfolglosigkeit der internen Mittel die mechanische Entleerung des Hautwassers in Aussicht genommen, doch immer wegen des Risicos eines Erysipels zurückgestellt. Erst als der willensstarke Mann die Leiden nicht mehr zu ertragen vermochte, wurde die Incision vorgenommen, an jedem Unterschenkel über den Malleolen. Aus dem rechten Schnitt ergossen sich große Wassermassen, während links der Abfluss ein geringerer war. In wenigen Stunden hatten sich über 10 Liter entleert.

Der Effect der Incisionen war ein sehr guter: Die Dyspnoe verlor sich gleich, so dafs Pat. von nun ab wieder schlafen konnte. Obgleich zuerst rechts, dann auch links locale Gangrän der Wundränder sich entwickelte, trat doch ein großer Umschwung im Allgemeinbefinden des Kranken ein, und gewifs wäre es gelungen ein relatives Wohlbefinden für längere Zeit herzustellen. Rechts war die Wunde verheilt, das Bein blieb in der Einwicklung dauernd mager und schon machte sich links eine Tendenz zur Heilung geltend, als plötzlich unter Schüttelfrost ein Erysipel hinzutrat, das, vom Fuß beginnend, über den ganzen Körper wanderte und in 8 Tagen — 5 Wochen nach der Incision — am 12. VI. 87 die Kräfte des Kranken erschöpft hatte.

Section: Herz LV 0,9 bis 1,0; stark dilatirt, trübes Herzfleisch, myocarditische Herde in großer Zahl und von verschiedenen Dimensionen, Aorta diffus, nicht hochgradig sclerosirt, dilatirt.

RV. 0,5 keine Sclerosen, Klappen normal, Art. coron. anfangs dilatirt, hochgradig sclerofirt, verkalkt, später hochgradig verengt.

Lunge: l. frei; r. oben verwachsen, Stauungshyperämie. Leber, große Muscatnussleber. Niere: 14, 6, 3½; 14, 6, 5. Rinde breit, dunkelroth, gelb gefleckte Oberfläche. Milz 12, 5, 4, kein Ascites, kein Hydrothorax.

2. Straub's Trichterdrainage.

An die offene Incision schließt sich naturgemäß Straub's Trichterdrainage an, deren aseptische Modification sie darstellen soll. Wie wenig jedoch dieses der Fall ist, soll sogleich gezeigt werden. Die Mangelhaftigkeit der nachfolgenden Casuistik möge darin ihre Entschuldigung finden, daß das Straub'sche Verfahren im Rtg. Kranken haufe bald aufgegeben wurde, was freilich keine Empfehlung ist. Indem ich meine Casuistik durch 4 von Straub publicirte Fälle completire, glaube ich den eben gemachten Vorwurf in unparteilicher Weise eher zu stützen als zu entkräften.

Tabelle 2.
Straub's Trichterdrainage.

N ^o .	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
1.	Benzel Hirschberg 65 a. n. 27. II — 11. V 87.	Emphys. palm.	2. III. Trichter am Scrotum.	4800 CC. 1200 CC.	in 4 Tagen. in 2 Tg.	Keine.	cf. Tab. I Nr. 2.
2.	Afonassy Lukjanow 62. a. n. 9. VI — 16. VII 87. †	Myoedg. cord. (Pericar- ditis) Hydrops univers.	16. VI. Trichter am l. Unterschenkel.	900 CC.	24 Std.	22. VI Erysipel d. l. Untersch. von d. Inc. stelle aus- gehend. Schüttel- frost. Temperat. steigung.	Am 26. VI Spontan- gangrän des Scrotums. Am 6. VII Spontanrup- tur der Haut des r. Ober- schenkels.
3.	Lisette Grell 61 a. n. 3 X 86. — 14. II 87. †	Myoedg. cord. (Stau- ungsleber und -niere) Starkes Ana- sarka d. Unter- extremitäten.	29. XII. Trichter am l. Untersch 5. II. 2 Trichter am r. Untersch.	Reichliche Ent- leerung. Reichl. Entl.	— —	Keine. 10. II. Erysipel des r. Untersch. In der Folge wird der grösste Theil des Unter- und Obersch. gangränös.	Die reichl. Entleerung schafften grosse subj. Er- leichterung, blieben jedoch ohne Rückwirkung auf das Allgemeinbefinden. Die Beschleunigung des Todes durch das Erysipel verlauf nach dem Krankheits- verlauf ausser Zweifel.
4.	Peter Jacob- sohn 40 a. n. 21. X 86. — 13 XI 1886. †	Emphys. palm. Hoch- gradiges Anas. univers.	7 XI. Trichter am l. Untersch.	Kein Effect, der Trichter musste entfernt werden, da beständig nachströmendes Blut denselben		9. XI. Erys. d. Inci- sionswunde. Frostanfall. Temperatur- steigerung.	Beschleunigung des exi- tus durch das Erysipel.

panowa 15 a n. 6. X — 11 XI 86.	Ascites, Starkes Oedem d. Un- terextrem.	Trichter am r. Untersch. 12. X. Tr. a. l. U. 29. X. Tr. a. l. U. Tr. a. r. U.	2000 CC. 3500 CC. 2000 CC. 1200 CC.	48 Std. 72 Std 48 St.	Keine. Keine. Keine.	Im Verein mit Abdomen- punktionen hatten d. Haut- wasserpunktionen -gut ge- wirkt; subj. und objective Erleichterung. Der baldige Einsuss war jedoch voraus- zusehen, da Hydrothorax sich hinzugesellte. Indess wurde Patientin der An- stalt entzogen.
6. Joh. Damnek 43. a. n. 23 II — 25 IV 83. †	Neph r. parench. Hy- drops cavit Anas. univers.	28. II. Trichter am. l. Untersch.	4 mal ohne Er- folg versucht, da Blutgerinnsel ihn verstopfen.		Keine.	
7. Jaan Dars- nek 43 a. n. 28 IV — 3 X 86.	Neph r. parench. sec. Schrumpfhier. Hydrops cavit. Anas. univers	6 VII. Trichter am l. Oberschenkel.	Mehrmals ohne Erfolg versucht; Blutgerinnsel verstopfen ihn.		Keine.	
8. Iwan Pima- now 39 a n 4. IX — 23. X 83.	Mr. Br. hoch- gradiges Anas. universal.	5. X. Trichter am l. Unterschenkel.	Die Application misslingt gleichfalls.		23. X. Ganggrä- necisirendes Erysipel der Incisionsstelle.	
9. Awdotja Ma- kejew 26 a. n. 22. II 89. —	Neph r. acuta Urämie Gerin- ges Oedem der Unterextrem u. d. Bauchhaut.	9. III. Trichter an der Bauchhaut Function mit der Nadel	700 CC.	24 Std.	Keine.	Vorübergehende Erleich- terung. Tags vor d. Punkti- on und nach derselben urä- mischer Anfall.
10. Herr v. O—S. *) 40 a n.	Insuff. v. Aortae. (Neph- ritis). Starkes Oedem d. Unter- extremitäten.	Trichter am Unterschenkel.	Rasches Ver- siegen nach an- fangs guter Wirkung.		Keine.	

*) Aus der Privatpraxis Dr. Hanapeln's.

Die 4 Fälle Straub's.

N ^o	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complica- tionen.	Bemerkungen.
1.	Agathe W. 42 a. n. 10. I — 7. II 82. †	Mr. Br.	13. I. 2 Tr. am Bauch. 14. I. 2 Tr. a. d. U 26. I. 1 Tr. a. Bauch.	2270 CC. 2800 CC. 8050 CC. 13,120 CC.	2 1/2 Std. 7 24 33 1/2 Std.	Keine Keine. Keine.	
2.	Rosine W. 29 a. n. 24. IV — IX 82.	Mr. Br.	6. VII. 2 Trichter.	1800 CC.	—	Keine.	
3.	Karl S. 59 a. n. I — 30. III 82.	Degen cord.	26. I — 16. III. 4 Trichter.	2700 CC.	—	Keine.	Abfallen des Trichters.
4.	Christoph W. 26 a. n. 19. VI — 9. IX 82.	Mr. Br.	2 Tr. a. 24. VI. 1 Tr. a. 26. VI. Tr. am 2. VIII	19,000 24,000 10,000	48 Std. 79 Std. 4 Tage.	— Erysipel. —	

Aus den vorliegenden 14 Fällen läßt sich resumiren:

I. Hinsichtlich des Effectes ist zweierlei zu unterscheiden: für den Fall des Gelingens — der Trichter bleibt haften und der Abfluß geht gut von Statten — ist es keine Frage, daß die Trichterdrainage Genügendes zu leisten vermag. Dennoch wird sie die Leistung des tiefen Schnittes nicht zu ersetzen im Stande sein, denn a priori wird sich aus einer mit der Punctionsnadel geschaffenen Wunde oder aus einer höchstens 1 Ctm. langen Incision weniger Serum entleeren, als aus der die Zellgewebsmaschen ausgiebig eröffnenden langen Wunde des tiefen Schnittes, dessen Leistungen wir uns als werthbestimmendes Ideal immer vorhalten müssen. Die unterstützende Saugwirkung des Trichters wird diesem Nachtheil nicht aequivalent sein.

Im Falle des Nichtgelingens haben wir es wiederum mit den schon bekannten ungünstigen Verhältnissen der offenen Wunde zu thun, ganz wie bei der tiefen Incision. Dieser Fall tritt gewöhnlich dann ein, wenn durch Blut- oder Serumgerinnfel der Trichter verstopft wird, wodurch er bald zum Abfallen gebracht wird. Unter den 10 von mir referirten Fällen trat dieses 4 Mal ein; unter den 4 Fällen Straub's 1 Mal. Gegen den Einwand, daß, wenn die Blutung abgewartet werde, der Trichter doch haften müsse, läßt sich anführen, daß damit wieder die Asepsis gefährdet werde. Durch das viele Hantiren an der Wunde — in einem meiner Fälle ward 4 Mal der vergebliche Versuch gemacht, — durch das zeitweise Offenbleiben derselben werden neue Infectionsmöglichkeit geschaffen. Muß man nun schon mit solchen Zufällen rechnen, so denke man sie sich übertragen auf die ungünstigen Verhältnisse der Privat- oder Landarztpraxis, wo der dejourirende Assistent

und ein geschultes Wartepersonal fehlen. Auch ist an Ungeschicklichkeit und Nachlässigkeit des Patienten zu denken, die beide dazu beitragen, daß wir bei der nächsten Visite den Trichter nicht dort finden werden, wo wir ihn ließen. Unter solchen Umständen ist von einer Asepsis nicht mehr die Rede. Dieses bedenkend, ist die Trichterdrainage, wenn überhaupt nur der Anstaltspraxis anzuvertrauen, und ist es gewiß nicht rathsam sie jedem practischen Arzte zu empfehlen, wie Straub es thut.

In den übrig bleibenden 6 Fällen, wo die Trichterdrainage gelang, leistete dieselbe 3—4 Mal gute Dienste, worunter ich die Entleerung von mindestens 3—5 Litern verstehe. Eine geringere Entleerung bedeutet nicht mehr als eine sehr vorübergehende subjective Erleichterung. In den 4 Fällen Straub's war der technische Effect 2 Mal ein enormer, 2 Mal ein mittelmäßiger. Alle diese Thatfachen hängen indess von so ungleichen Umständen ab, daß ein directer Vergleich nicht zulässig erscheint.

2. **Hinichtlich der Verminderung der Wundcomplicationen**, geht hervor, daß auch hier die gute Absicht nicht vom thatsächlichen Erfolge gekrönt wurde.

Unter meinen 10 Fällen trat 4 Mal meist schweres Erysipel hinzu, unter den 4 Fällen Straub's 1 Mal. Es ist dieses sehr wenig auffallend, wenn man bedenkt, daß dadurch, daß anfänglich unter Luftabschluß und antiseptischer Flüssigkeit operirt wird, die Gefahr der Wundcomplication noch nicht abgelenkt ist. Dazu müßten noch weitere Bedingungen erfüllt sein: einmal müßte das schon erwähnte Abfallen des Trichters ausgeschlossen sein, und zweitens die Garantie eines sicheren Verschlusses geboten werden, was namentlich dann nicht ohne Weiteres erreichbar ist, wenn wir

des gröfseren Effectes wegen, der einfachen Nadelpunktion eine tiefere Incision vorziehen. Das verhängnißvolle Nachsickern der Wunde besteht dann hier ebenso wie bei der offenen Incision.

Demnach liesse sich über die Trichter-drainage folgendes Urtheil rechtfertigen:

Die Leistungen derselben sind kleiner als die des Schnittes;

ihre Gefahr nur unter Bedingungen geringer, deren Erfüllung leider nicht immer von uns erfüllt werden können;

sie eignet sich ausserhalb der Anstalts-praxis nicht.

3. Die Capillardrainage mit dem Troikart Southey's.

Was leistet nun die 3. Methode, der Empfehlungen Traube's, Ziemssens, Rosenstein's beigegeben sind, die jetzt auf den meisten Kliniken üblich ist und durch die Lehrbücher bereits ihren Rundgang macht -- die Capillardrainage¹⁾?

Das zur Drainage verwendbare Instrument ist nicht gleichgültig. Southey's Capillary Drainage Trocar for Anafarka erfreut sich grosser Popularität und war auch im Rig. Krankenhause eine Zeit lang üblich. Die zierlichen Instrumente sind ca. 2,7 Cm. lang, seitlich mit

1) Ausser den bereits hier und früher genannten Autoren, treten von englischer Seite noch Hopkins Walter (Lanzet 1878, Nr. VIII), von französischer Verneuil in Paris und Gibert in Havre für diese Methode ein. Letzterer Mittheilungen waren mir indess nicht zugänglich.

In den Lehrbüchern Eichhorst's, Strümpell's, Niemeyer-Seitz's, Fürbringer's findet man ihre Empfehlung.

feinen Löchern versehen und halten im Durchschnitt ca. 1,25 Mm. Im übrigen gleichen sie jedem anderen Troikart.

Speciell mit dem Southey'schen Troikart wurden im Rig. Krankenhaus 16 Pat. behandelt. Obgleich diese Zahl eine kleine genannt werden muß, gestattet sie doch mit vergleichender Hinzuziehung anderer Casuistiken ein genügendes Urtheil. Ich completeire sie daher durch 28 Fälle des Münchener Krankenhauses, welche Kopp¹⁾ beschrieb und 5 Fälle der Tübinger Klinik, welche Straub²⁾ veröffentlichte.

1) Kopp l. c.

2) Straub l. c.

Die Capillardrainage mit dem Troikart Southey's.

N ^o	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
1.	Dominik Gudowitsch, 39 a. n. 6. XII 85 — 3. I 86 †	Mr. Brightii (Tuberc. pulm.) Hydrothorax. Starkes Anasarka des Bauches, der Genitalien und Unterextrem.	20. XII. 1 Southey am Scrotum.	Sehr reichlich.	—	Keine.	D. Scrotum schwell vollständig ab, auch das Oedem der Schenkel wurde zeitweise geringer. 30 XII gangränescirendes Erysipel beider Oberschenkel, ausgehend von spontan rupturirten Bläschen.
2.	Carl Withol, 55 a. n. 12. VIII — 1. X 85 †	Myodegen. cordis. Bedeutendes Anasarka der Unterextrem.	25. IX. 2 Southey's am 1. Unterschenkel.	Gering.	—	Keine.	
3.	Dimitri Gultitzki, 60 a. n. 2. IX — 9. X 85 †	Mr. Br. Anas. univers.	20. IX. 1 Southey am Scrotum.	Mässig.	—	Keine.	
4.	Grigori Sidortschick, 38 a. n. 1. VII — 21. IX 85	Insuff. v. mitr. Starkes Anas. d. Unterextrem.	3. VII. 1 Pravaz'sche Nadel am Scrotum. 1 Pravaz'sche N. am Unterschenkel.	Kein Effect. 120 CC.	— 24 Std.	Keine. Keine.	cf. Tab. I Nr. 11.
5.	Martin Silling, 30 a. n. 21. XII 83 — 28. I 84 †	Mr. Br. (Tubercul. pulm.) Hohegradiges Anas. univers.	10. I. 2 Southey's, an jedem Unterschenkel einer.	Gut.	—	Keine.	Grosse subj. Erleichterung durch die Abnahme des Oedems.

Nr.	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
6.	Karoline Krimberg, 32 a. n. 5.XI 83—12.II 84 †	Mr. Br. Hydrothorax. Allgemeines Anasarka bes. d. Unterextrem.	7. XI. An jedem Unterschenkel 1 Southey (2). 12. XI. 2 Southey's.	Sehr befriedigend.	48 Std.	Keine.	Nachdem die Punktionen verheilt waren, tritt am 23. XI Erysipel am l. Unterschl. auf. Es steigt bis zum Tracheanter hinauf. 31. I 84 Erysipelas faciei, Spaltung eines Lidabscesses. 2. II. Erys. am r. Oberschl. 4. II. Erys. am l. Unterschl.
7.	Joseph Schaf, 27 a. n. 10. I 84 — 15. III 84 †	Neph. acuta. Anas. univers.	29. I. 2 Southey's (Untersch.) 2. II. 1 Southey am Scrotum. 3. III. 2 Southey's am Unterschenkel.	Reichliche Entleerung.	—	Keine.	
8.	Christian Blumberg, 62 a. n. 3. IV — 12. IV 84 †	Mr. Br. Hochgradiges Anas. univers.	7. IV. 1 Southey am Scrotum. 1 Southey am penis.	Sehr reichliche Entleerung.	—	10. IV. Erysipel am Scrotum (Spontanerysipel). (?)	Vor dem Eintritt des Pat. bestanden schon seit 8 Tagen Excoriationen des Scrotums und der Extremitäten, so dass das Erysipel auch von hieraus entstanden sein kann.
9.	Ans Karro, 44 a. n. 29. XII 82 — 19. I 83	Cor. adipos. Hydropericard. Anas. univers.	11. I. 1 Southey am Scrotum.	Reichliche Entleerung.	—	Keine.	

43 a. n. 23. II - 25. IV 83	Hydrops cavit. Anas. univers.	3 Southey's 1 am Obersch., 1 am Bauch u. 1 an der Brust.	lich.	10 Std.	Leichtes Erysipel. Obersch. (T ^o 39) verläuft günstig.	am 1. III. puncto ad- dominis - 9000 CC; ge- bessert entlassen. cf. Tab. II Nr. 6.
11. Elisabeth Ber- tulschn, 67 a. n. 12. V - 22. V 83. †	Insuff. v. mitr. Ascites, sehr star- kes Anasarka univers.	18. V. 1 Southey am r. Untersch.	Reichlich.	24 Std.	18. V Abds. Erysipel. r. Untersch.	
12. Joh. Darsneek, 43 a. n. 28. VI - 3. X 83.	Nephrr. parench. sec. Schrumppf- niere. Hydrops cavit. Anas. univers.	6. VII. 1 Southey am Scrotum.	Gut.	—	Keine.	4. IX. Spontanerys. am l. Obersch. u. Un- tersch., das sich bis auf den Rücken verbreitet. Mehrfache Abdomen- u. Pleurapunctionen. Gebes- sert entlassen. cf. Tab. II Nr. 7.
13. Gustav Kröger, 19 a. n. 23. X - 6. XII 83.	Nephrr. parench. Anas. univ.	5. XI. 1 Southey am Scrotum. 7. XI. 1 Southey am Scrotum.	Gut.	24 Std.	Keine.	Gebessert entlassen.
14. Frh. P. †	Arterioscl. univers.	Mehrere Southey's.	Gut.	—	Keine.	
15. Herr N.* †	Cor adipos.	Pravaz'sche N.	Gut.	—	Keine.	
16. Dr. W.* †	Scleros. art. coronar. Nephrr. parench.	1 Southey am Scrotum. 2 Southey an den Unterschenkeln.	Gut. Gering.	— —	Keine. Keine.	
16 Pat.		Ca. 35 Canülen.				2 resp. 3 mal Erysipel, welches 2 resp. 3 Pat. betraf.

*) Fall 14, 15, 16 stammen aus der Privatpraxis Dr. H's.

5 Fälle Straub's (Tübinger Klinik).

Nr.	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
1.	Alois Sch., 26 a. n. 15. VII — 20. II 79 †	Nephrr. parench.	13. XII. 2 Southey's am r. Unterschenkel.	12.200 CC.	ca. 3 Tage.	Erysipel.	
2.	Helene Fr., 40 a. n. 15. III — 4. IV 80	Cirrh. hepat. Degen. cordis.	23. III. 4 Canülen.	1200 CC.	10 Std.	Keine.	Die Troikarts waren nach 10 St. herausgefallen.
3.	Magdalene G., 13 a. n. 4. V — 9. V 80. †	Nephrr. parench.	8. V. 4 Canülen.	2400 CC.	22 Std.	Keine.	2 Troikarts fielen heraus, 2 verstopften sich.
4.	Katharina R., 36 a. n. 31. V — 17. VI 80	Nephrr. parench.	4. VI. 2 (?) Canülen an beiden Untersch. 5. VI. Ebenso.	2700 CC.	—	Erysipel am l. Unter- schenkel.	Beide Troikarts fielen heraus.
5.	Marie Str., 35 a. n. 1. II — 25. III 81 †	Nephrr. parench.	16. III. 2 Canülen in die Untersch.	2500 CC.	—	Keine.	
	5 Pat.		Ca. 16 Canülen.			3 mal	

Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
Ueber die 17 ersten Fälle resumirt Kopp:				
An 17 Patienten wurde 28 mal die Punction mit im Ganzen 35 Canülen ausgeführt. Dadurch wurden in Ganzen	62,500 CC. entleert = 2000 CC. pr. die aus durchschnittlich 4 Canülen. An dieser Zahl participirten bes. 17 Punctionen. In 11 Punctionen war der Effect ohne Belang.	Die Gesammtzeit betrug 750 St.	4 mal trat leichtes Erysipel mit circumscripiter Gangrän auf; 4 mal verbreitete sich das Erysipel auf weitere Strecken und mag demselben eine Beschleunigung des Fortschritts zuzuschreiben werden. Diese 8 Wundcomplicationen betrafen 5 Patienten.	In 2 Fällen fielen die Canülen heraus.

Die 11 weiteren Fällen:

Name.	Diagnose.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
1. St. A. 59 a. n.	Sten. v. mitralis	3 Canülen.	Beträchtliche Menge.	---	Keine.	
2. St. V. 44 a. n.	Myodegen. cordis	1 Punction mit 5 Canülen.	4000 CC. Ein gr. Theil ging verloren.	18 Std.	Keine.	

N ^o	Name.	Diagnose.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Complicationen.	Bemerkungen.
3.	K. J. 33 a. n.	Myodeg.	4 Canülen.	Gering.	24 Std.	Keine.	
4.	N. K. 39 a. n.	Vit. cordis congenit.	4 Canülen.	Gering.	—	Keine.	
5.	T. E. 45 a. n.	Insuff. v. mitral.	2 Punctionen mit 7 Canülen.	2000; ein Theil ging verloren.	24 Std.	Leichtes Erysipel der Punctionsstelle an beiden Un- terschenkeln.	
6.	A. M. 15 a. n.	Nephr. parench.	2 Canülen am labium majus.	90 CC.	—	Keine.	
7.	Sch. G. 49 a. n.	Lebercirrh.	4 Canülen.	Kein Erfolg.	—	Erysipel.	
8.	E. R. 44 a. n.	Nephr. parench.	2 Punctionen mit 4 Canülen.	Beträchtliche Menge.	24 Std.	Keine.	
9.	H. E. 32 a. n.	Nephr. parench.	13 Punctionen mit 49 Canülen.	27,000 CC.	—	Nach 3 Punk- tionen trat Erysipel auf.	
10.	L. J. 27 a. n.	Endocard.	6 Punctionen mit 21 Canülen.	15,370 CC.	—	Nach 1 Punction trat Erysipel auf.	
11.	F. Fr. 42 a. n.	Myocard.	4 Canülen.	9500 CC.	24 Std.	Erysipel.	
II Pat.			107 Canülen.			8 mal trat Ery- sipel auf, wo- durch 5 Pat. betroffen wur-	

Aus den vorhergehenden Tabellen ergeben sich folgende Thatfachen:

1) stellte es sich heraus, daß bei der Drainagemethode Wundcomplicationen nicht fortblieben, trotzdem eine absolute Antiseptis sich leicht durchführen läßt. Für einen Theil der Fälle wird zugegeben werden können, daß der Arzt, das Wartepersonal oder der Patient selbst die Schuld davon zu übernehmen haben, daß die Strenge der Antiseptis nicht gewahrt wurde. Nach der von mir wiedergegebenen Casuistik trat nach Application von ca. 35 Canülen, welche sich auf 16 Patienten vertheilten, 2 mal Erysipel auf, was ungefähr 5,7 % ausmacht, wobei ich betone, daß die Zahl der Canülen und die Zahl der Wundcomplicationen als Vergleichsziffer zu gelten haben. Aus der Kopp'schen Casuistik ergibt sich ungefähr eine Wundcomplication von 8,3 %, von den 5 Patienten Straub's, welche mit im Ganzen 16 Canülen behandelt wurden bekamen 3 Erysipel.

Soll nun für diese Thatfache ein Erklärungsgrund abgegeben werden, so gebe ich für die Complicationsziffer meiner Casuistik gerne zu, daß sie auf Kosten eigener oder fremder Schuld zu setzen ist. Für die größere Complicationsziffer der Münchener und Tübinger Berichte wage ich diese Beschuldigung indess nicht zu erheben und da in den Mittheilungen noch anderer Krankenhäuser das Zugeständniß gemacht wird, daß der theoretisch zu fordernde reaktionslose Verlauf der kleinen Troikartwunde bei Hydrophischen thatfächlich doch nicht immer eintrat, so wäre zunächst die Frage aufzuwerfen, ob diese Thatfache nicht einfach auf Kosten der Antiseptis zu setzen sei. Es ist in der That ein auffallendes Ergebniß, daß es trotz aller Antiseptis nicht gelingen will, die nadelfeine Troikartwunde

eines Hydropischen reaktionslos zu erhalten, während es doch über jeden Zweifel erhaben ist, daß die ausgedehntesten Eingriffe, zu denen sich die moderne Chirurgie leicht entschließt, diese Gefahr nicht zu fürchten haben. Die Haut eines Hydropischen, besonders vielleicht die des Nephritikers hätte dann als ein ganz anderes Objekt zu gelten, als die eines Gesunden, oder anderswie Kranken, (mit Ausnahme des Diabetikers). Daß die vermehrte Dehnung der Haut einerseits, die veränderte Blutbeschaffenheit und die behinderten Ernährungsverhältnisse andererseits, zum Zustandekommen dieser Thatfache kräftig mitwirken, das erscheint uns fraglos.

Diese Fälle müßten dann der Antiseptis gegenüber eine apparte Stellung einnehmen und umgekehrt müssen die Erfolge der Antiseptis unter diesen veränderten Umständen mit anderen Masse als dem gewöhnlichen gemessen werden.

Endgiltig über dieses Bedenken zu entscheiden ist zur Zeit sehr schwer. Es wird zunächst die Aufgabe erfüllt werden müssen, durch Ausbildung einer fehlerfreien Technik, jede Schuld an einer Wundcomplication abweisen zu können.

Ehe jedoch dieses erreicht ist, kann bereits über die Capillardrainage das Urtheil ausgesprochen werden, daß sie gegenüber den früheren Methoden, der Incision, Scarification und Acupunctur die Gefahr des Erysipels am meisten ausschließt, ja, nach den Erfahrungen meiner Casuistik ist diese Gefahr eine sehr geringe geworden.

2). Die Resultate der vorangestellten Statistik lassen sich nun ferner nach einer anderen Richtung hin betrachten. Vergleicht man gegenüber der Zahl der Canülen und Wundcomplicationen die Zahl der behandelten Pat. mit der der Wundcomplicationen, so ergibt sich:

bei 28 Pat. Kopp's trat 16 Mal Eryf. auf, bei Anwendung von 192 Canülen;

bei 16 meiner Pat. trat 2 Mal Eryf. auf, bei Anwendung von 35 Canülen.

Wendet man demnach die Canülen so ausgiebig an, wie auf der Ziemssen'schen Klinik, so wird dadurch der Vortheil der Drainage sehr herabgesetzt. Es kommt also darauf an, die Zahl der Canülen zu verringern, denn jeder Stich mehr, vermehrt die Gefahr. Diese Erfahrung zwingt die Methode nach einer bestimmten Richtung hin zu vervollkommen: nämlich die Canülen zu vergrößern, damit ihre Zahl bei der Anwendung verringert werde, in dem Maße, als ihre absolute Leistung wächst. Die Subtilität der Southey'schen Canülen, durch die sie gewiss am meisten bestachen und populär geworden sind, ist demnach ihr größter Nachtheil. Gegenüber diesem Nachtheile, daß sie immer in größerer Anzahl angewandt werden müssen, möge die Aufzählung der übrigen Folgen ihrer Subtilität vielleicht kleinlich erscheinen: daß sie sich leicht verstopfen, durch die geringe Schwere des Schlauches schon herausgezogen werden, durch die gleichzeitige, mehrfache Application' den Pat. fast absolut an Bewegungen verhindern und dergl.

3) Im Allgemeinen ist die mit den Capillartroikarts erzielbare Gesamtleistung geringer als die der Incisionen. Von einem curativen Effect wird nicht oft die Rede sein können, aus der Zahl der angeführten Fälle ragen jedoch einige hervor, bei denen die Entleerung wohl Nichts zu wünschen übrig liefs. Immer indess wird man zum Ziel gelangen, wo es nur gilt, vorübergehende Erleichterung zu schaffen und das sind ja die meisten Fälle. Die von Kopp bezeichnete Durchschnittsentleerung von 2000 Ccm. pro die aus ca. 4 Canülen können auch wir bestätigen;

bei weichem Oedem ist durchschnittlich weit mehr zu erwarten (3—5 Lit.); bei hartem Oedem, wie es sich bei Sclerose der Haut und des Unterhautzellgewebes nach langdauernder Stauung in den oberflächlichen Venen entwickelt, ist immer nur auf die Entleerung einiger 100 Ccm. zu rechnen. Bestimmtes läßt sich in diesem Punkte nicht feststellen.

4. Die gegenwärtige im Rigaschen Stadtkrankenhaus übliche Capillardrainage.

Der oben ausgeführten Ueberlegung folgend, daß die Gefahr der Wundkomplikation mit der Verringerung der anzuwendenden Zahl von Canülen herabgesetzt werde, sind für den Gebrauch des Rigaschen Krankenhauses grössere Troikarts construirt worden, deren Leistungsfähigkeit eine Verwendung nur in geringer Zahl nöthig macht. Dieselben sind ca. 3,5 — 4 Cm. lang, rund, im Durchschnitt 2,5 Mm. haltend, vernickelt oder versilbert. Die Wand ist von 3, ca. 2 Cm. langen und 1 Mm. breiten Fenstern durchbrochen, welche dem feithichen Abflusse dienen. Bei der Anfertigung derselben ist strengstens darauf zu achten, daß das Stilet ohne jede Unterbrechung in den Rand der Canüle übergehe, weil schon die kleinste Unebenheit das Einstossen in die gespannte Haut unmöglich macht. Der Theil, welcher die Fensterung trägt, kann auch leicht spindelförmig anschwellen, wodurch das Lumen vergrößert, das Herausfallen erschwert wird.

In der bestimmten Hoffnung, daß eine aufs Strengste durchgeführte Antisepsis auch wirklich jede Wundcomplication ausschliessen müsse, wurde dieser eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt.

Die Haut des Patienten wird vor dem Stich mit Wasser, Seife, Bürste und Sublimat gereinigt; die Canülen

werden in Sublimat ausgekocht; hineingestofsen, werden sie mit einem Schlauch armirt, der das ausfließende Wasser sofort ableitet; die Umgebung des Stiches wird mit Jodoform leicht gepudert und durch einen Salicylwatteverband geschützt. Längstens bleiben die Canülen 24 Stunden liegen.

Die größte Sorgfalt verdient die *Nachbehandlung* der kleinen Wunde. Unter allen Umständen muß erreicht werden, daß dieselbe nicht nachsickere, denn dann ist unsere ganze Antisepsis illusorisch. Weniger sicher war dieses Ziel durch das Anlegen eines comprimirenden Wattenbindenverbandes zu erreichen, als vielmehr durch einen *Photoxylin*-schutz. Es empfiehlt sich auf der Stichwunde ein kleines Wattebäufchen auszubreiten und mit dem von v. Wahl¹⁾ in die Praxis eingeführten Photoxylin (5—10 %) so lange dick zu bestreichen, bis das Wattebäufchen haftet und absolut undurchlässig geworden ist. Auch andere kleine Erfahrungen mögen hier mitgeteilt werden:

Um den Stich so gut wie schmerzlos zu machen, applicire man zuvor Eis (10 Min.), Aetherspray oder Cocaininjectionen reizen die Haut und sind verwerflich.

Dem leidigen Herausfallen der Canülen beugt man sicher auf die Weise vor, daß man den Schlauch eine Windung nach oben machen läßt und diese über dem Stich mit Heftflaster befestigt.

Das zum Auffangen dienliche Gefäß stehe außerhalb des Bettes und möglichst tief, der Pat. wird dann nicht belästigt werden und das abfließende Wasser saugt durch seine Schwere.

Die auf diese Weise behandelten Fälle stelle ich in der folgenden Tabelle zusammen:

1) v. Wahl. St. Petersburg. med. Zeitschrift Nr. 20, 1887. Therap. Monatshefte 1888 p. 264.

Tabelle 4.

Die gegenwärtige in ligaschen Krankenhaus übliche Capillardrainage.

Nr.	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Spec. Gew.	Complica- tionen.	Bemerkungen.
1.	Jahn Rose, 39. a. n. 28. VI — 18. VII 88. +	Stenos. ost. v. sin. (Hyper trophy. Dilatatio, Degen- gen. cordis). Hydro- thorax sin. Hoch- gradiges Oedem der Unterextrem. der Genitalien u. des Rückens.	6. VII. Punctio scrodi. 13. VII. P. crur. dextr. 16. VII. P. crur. sin.	Gr. subj. Erleichtertg. 1200 CC. 800	10 Std. 10 Std.	1007 1007	Keine. Keine.	
2.	Andrei Mee- se. 39 a. n. 14. (V—8. VII 88.	Insuff. v. aortae Dilat. aort. asc. Myodegen. cord. Infarkt. pulm.) Starkes Oedem d. Unterextrem. und des Gesichtes.	11. V P. crur. sin. 13. V P. crur. dext. 26. V P. crur. sin. 27. V P. crur. dext. 4. VI P. crur. sin. 11. VI P. crur. sin. 16. VI P. crur. dext. 21. VI P. crur. sin. 25. VI P. crur. dext. 30. VI P. crur. sin. 2. VII P. crur. dext. 5. VII P. crur. sin.	5250 4000 5300 4000 4000 1800 4900 2700 3400 2300 1200 1000 39,850 CC.	20 Std. 20 „ 22 „ 18 „ 20 „ 20 „ 20 „ 12 „ 20 „ 20 „ 18 „	1008 1008 1008 1008 1008 1006 1008 1008 1006 1007 1006	Keine. Keine.	7. VI. Spontan- erysipel des Scro- tums, trotzdem wurde mit den Punktionen fortgefahren.
3.	Adolph Strecker, 28 a. n. 8. VI — 26. VIII 88	Insuff. v. mitr. Oedem der Unter- extremitäten.	12 Canülen. 25. VII. P. crur. n.	1000	5 Std.	1006	Keine.	Plötzlicher Tod beim Versuche aufzustehen.

Anna Gröb- bing, 39 a. n. 15. VIII — 19. VIII 88. †	Myocarditis (Oe- nos. aortae. Pneu- monia serosa du- plex). Starkes Oedem d. Unterext. und des Bauches.	P. crur. dextr. 11. VIII.	14 Std.	1008	Keine.
5. Jos. Freit- berg*, 50 a. n. †	Neph. parench.	30. V P. scroti. 31. V P. praepul. 1. VI P. scroti. 21. VIP. crur. dext.	24 Std. — — —	— — — —	Keine. Keine. Erysipel. Keine.
6. Peter Dumpe, 30 a. n. 11. I — 1. II 89. †	Neph. parench. (Tuberc. pulm. Enteritis). Hydrops cavitat. Anas. univers.	19. I. P. crur. sin. P. crur. dextr. 20. I. P. femor sin.	20 Std. 20 Std. — 4 Std.	1009 1008 — 1008	Keine. Keine. Keine.
7. Anna Maih- sit, 72 a. n. 6. I — 1. III 89. †	Mr. Br. Oedem der Unterextrem. u. besonders star- kes der Bauch- decken. Ascites.	19. II P. cut. abdom. 13. I P. fem. dext. 23. I P. cut. abd. Zum Vergleich wer- den Southey'sche Troikarts ange- wandt: 17. II 1 Southey am r. Untersch. 22. II 1 Southey am Bauch.	4 1/2 S. 19 Std. 20 Std. —	1008 — 1009 —	Keine. Keine. Keine.
			32 Std. 10 Std.	1007 —	Keine. Keine.

* Aus der Privatpraxis Dr. Harnpein's.

(geringer Erfolg.

Das Erysipel war
entstanden, nachdem
d. Canüle mit schmutzi-
gen Händen von einem
Bekannten d. Patienten
entfernt worden war.
Rasches Verheilen.

20. I. Diesmal war
die Indication dadurch
gegeben, dass sich am
I. Obersch. eine Spon-
tanruptur der Haut vor-
bereitete. Unter der
diaphanen Haut war
bereits freies Wasser
sichtbar.

29. I. Spontan
Erysipel am dors.
ped. sin.

stark gerun. Flüssigk.
Nicht gerinnend.
Gerinnend; grosse
subj. Erleichtg. nach
jeder P. Dyspnoe
schwindet.

Die folgenden Fälle boten keine Indication; die Punktionen werden nur zu demonstrativen Zwecken gemacht. Entsprechend dem geringen Oedem, waren d. Entleerung, wie vorauszusehen, geringe.

N ^o	Name und Datum.	Krankheit.	Eingriff.	Effect.	Zeit.	Spec. Gew.	Complicationen.	Bemerkungen.
8.	Agafja Chachlowa, 62 a. n. 10. II — 24. III 1889.	Myoedg. cordis. Mächtiges Unterschenkeloedem.	13. II P. crur. dext. 16. II P. crur. sin.	1500 1100	20 Std. —	1007 1009	Keine. Keine.	
9.	Anna Jacobsohn, 49 a. n. 6. X 88.	Insuff. v. mitr. Geringes Extremitätenoedem. Hautsclerose.	3. II. P. crur. dext.	1 Bierglass.	20 Std.	1007	Keine.	
10.	Akulina Chodkowskaja, 39 a. n.	Myoedg. cord. Oedem d. Unterschenkel.	2. II. P. crur. sin. P. crur. dext.	1300 1250	20 Std. 20 Std.	1007 1008	Keine. Keine.	
11.	Caroline Silbling, 30 a. n. 19. II — 26. II 89. †	Neph. amyloid. Oedem d. Extremitäten.	7. II. P. crur. sin. 20. II. 1 Southey am l. Unterschenkel.	1500 400	20 Std. 20 Std.	1006 1006	Keine. Erysipel.	Leider stellte es sich erst zu spät heraus, dass der Troikart vor d. Gebrauch nicht ausgekocht worden war. Das Erysipel ging bis zur Inguinalfalte hinauf und wurde gangränescirend.
12.	Awdotja Makejewa, 27 a. n. 22. II 89.	M. Br. Sehr mässiges Oedem.	19. III. P. crur. sin.	100	20 Std.	—	Keine.	cf. Tab. II Nr. 9. Hier konnte schon deshalb kein Effect erwartet werden, weil der Troikart in die mit alten luctischen Narben dicht besetzte Haut hineingestossen wurde.

Die vorliegenden 12 Fälle beweisen wol zur Genüge, daß die capillare Drainage fernerhin als ein fast gefahrloser Eingriff zu gelten hat. — Bei 38 Punktionen, die an 12 Patienten vorgenommen wurden, trat nur 2 Mal Erysipel auf. Beide Mal war ein Verstoß gegen die geforderte Strenge der Antiseptis begangen worden. Galt es nun zu beweisen, daß die Capillardrainage bei Einhaltung absoluter Antiseptis ein ganz gefahrloser Eingriff ist, so dürfte billiger Weise von diesen beiden Fällen abgesehen werden und die Richtigkeit dieser Behauptung erschiene bewiesen. Dennoch glaubte ich im vorausgehenden Abschnitt in Rücksichtnahme auf ungünstigere Berichte anderer Krankenhäuser, die Möglichkeit zugestehen zu müssen, die noch sehr hohe Complicationsziffer dieser Berichte nicht der Schuld der handelnden Personen, sondern der Antiseptis unserer Tage zur Last zu legen. Auch dieser Möglichkeit den Boden zu entziehen, dazu hielt ich mich erst für berechtigt, stände mir ein umfangreicheres Material zu Gebote.

Die 7 ersten Fälle der angeführten Tabelle zeigen ferner, daß hinsichtlich des Effektes ein größerer Troikart, wie er im Rigaschen Krankenhause üblich ist, ebenso viel zu leisten im Stande ist als etwa 2—4 Southey'sche. Auf die Vortheile, solchen Instrumenten den Vorzug zu geben, ist bereits genügend hingewiesen worden.

Der Fall Meese (Nr. 2) verdient noch kurz referirt zu werden.

A. M., 39 a. n., ist kräftig gebaut und gut genährt; seit 3 Wochen bestehen an den Unterextremitäten und im Gesicht Oedeme, die gegenwärtig sehr hochgradig sind; allgemeiner Kräfteschwund; mit starken Schmerzen verbundener Husten und Herzklopfen beunruhigen Pat. am meisten.

Stat. praes. am 14. IV. 88. Die Brust ist gut gebaut, die Lungen zeigen überall hellen Schall und weit

verbreitetes Rasseln. Der Herzbefund rechtfertigt sofort die Diagn. Insuff. v. Aortae; keine Höhlentranssudate. Harn klar, hell, ohne Albumin, 500 Ccm.

Verlauf: Coff. natrobenz., Digitalis, Calomel und Trockenkost haben bis zum 28. IV. 88 das Krankheitsbild ganz verändert. Husten, Dyspnoe und die hochgradigen Oedeme sind geschwunden. Die Harnmenge ist seit längerer Zeit 1500, am 28. IV. 2000. Dieses therapeutische Regime wird fortgesetzt. Dennoch treten die alten Zustände wieder auf. Die Harnmenge sinkt gradatim von 2000 auf 250 (am 10. Mai), Dyspnoe, Husten und Oedeme steigern sich unaufhaltsam. Am 11. Mai wurde daher zum letzten Mittel gegriffen, zur chirurg. Entleerung der Oedeme. Punctio crur. sin.: 5250 Ccm. in 20 Stunden. Die Harnmenge stieg auf 1800 (am 13. V.). 13. Mai P. crur. dext.: 4000 Ccm. in 20 Stunden. Die Harnmenge ist auf 3000 gestiegen (am 14. V.) und bleibt 4 Tage hindurch circa 1700. Pat. fühlt sich sehr erleichtert, die Beine sind dünner, der Puls besser geworden; die Dyspnoe hat nachgelassen.

Bis zum 26. V. ist abermals eine solche Verschlimmerung eingetreten, daß eine neue Punction nothwendig geworden ist.

26. V. P. crur. sin. 5300 Ccm. in 22 Stunden.

27. V. P. crur. dextr. 4000 Ccm. in 18 Stunden.

Die Beine sind dünner geworden, grofse subjective Erleichterung ist vorhanden; dennoch bleibt die Urinmenge niedrig, ca. 600.

Am 4. Juni werden 4000 Ccm. abgezapft; am 7. Juni tritt ein spontanes Erysipel am Scrotum hinzu, das fast bis zum Tode sich erhielt. Vom 1. VI. bis 30. VI., 5 weitere Punctionen, wobei 1800, 4900, 2700, 3400 und 2300 Ccm. entleert wurden. Während dieser Zeit, in der innerlich mit Strophant. Coffein und Campher fortgefahren wurde, steigerte sich die Diurese und erhielt sich constant auf 700, 800 bis 1000 Ccm. Der Puls besserte sich, die Athemnoth liefs nach jeder Punction nach. Das gangränescirende Erysipel des Scrotums stand im Vordergrund der Behandlung und trug nicht wenig zur Entkräftung des Pat. bei.

Am 2. Juli tritt ein hämopt. Infarct und einseitiger Hydrothorax auf. Zur Erleichterung wird Pat. noch 2 Mal punctirt. — Am 5. stirbt er im Collaps.

Anatom. Diagnose: Arteriosclerosis universal. Dilat. Aortae ascend. Insuff. relat. v. aort. Myodegen. et Hypertroph. cordis. Infarct. pulm. sup. dext. Hydrothorax.

Epicrise: Der günstige Einfluss, den die mechanische Entleerung des Hautwassers auf den Krankheitsverlauf hatte, zeigte sich besonders auffallend nach den beiden ersten Punctionen. Durch dieselben wurden über 9 Liter Wasser dem Kranken entzogen, die Herzmittel wirkten wieder, die Harnmenge flog rapid. Weiterhin ist das Bild ein sehr eintöniges, neue Verschlimmerungen machen neue Punctionen nothwendig. Diefen allen dürfte es zuzuschreiben sein, dass es gelang, das Leben des Pat. um eine beträchtliche Zeit zu verlängern, Qualen und Sterben ihm wesentlich zu erleichtern. — Besonders verdient noch der Umstand hervorgehoben zu werden, dass keine der Punctionen trotz eines gleichzeitig bestehenden Spontanerysipels zu irgend welchen Complicationen Veranlassung gab. Es scheint, als hätte die Technik der geübten Methode damit keine üble Probe bestanden.

R e f u m é.

Fasst man nun alle bisher mitgetheilten Erfahrungen zusammen, so ist zunächst festzustellen, dass die genannten Methoden keine gleichartigen sind und daher in der Praxis nicht promisque gebraucht werden dürfen. Vielmehr wird je nach dem Falle, die Gefährlosigkeit der einen, die grössere Leistungsfähigkeit der anderen Methode für ihre Anwendung Ausschlag gebend sein.

Die Capillardrainage, technisch so geübt und verbunden mit der strengsten Antisepsis, wie ich sie im letzten Abschnitt schilderte, ist die gefahrloseste Methode. Wo es sich um die symptomatische Behandlung verlorener Fälle handelt, wo dem Kranken hauptsächlich subjective Erleichterung geschaffen werden soll, da ist sie am Platze. Eine tiefe Incision einem an sich hoffnungslosen Brightiker beibringen, würde in der Mehrzahl der Fälle nichts Anderes bedeuten, als dessen Ende beschleunigen. Die Drainage wird demnach in der Praxis die am meisten zu übende Methode sein.

Nur für eine sehr kleine Anzahl von Fällen kommt dagegen der noch immer unersetzte tiefe Schnitt in Betracht; große Leistungsfähigkeit ist sein Vorzug, sein größter Nachtheil die Gefährlichkeit. Dieser Umstand bedingt eine *Indicatio vitalis* als Voraussetzung. Wo eine solche aber vorliegt, da wird er nicht unberücksichtigt gelassen werden dürfen; er wird dann nicht mehr zu umgehen sein, wenn die Gefahr einer weiteren Schädigung des Herzens und die Gefahr einer eventuellen Wundcomplication gleich groß ist. Wer seinen großen therapeutischen Nutzen kennen gelernt hat, der mag die Hoffnung nicht aufgeben, daß es neuen rationellen Bemühungen gelingen werde, ihm den Nachtheil der Gefahr zu nehmen. Vielleicht läßt sich die von Babington (cf. pag. 16) geübte Modification weiter verwerthen.

Im Rig. Krankenhause geht man mit dem Gedanken um, vorkommenden Falles in folgender Weise vorzugehen: Nachdem eine oder mehrere tiefe Incisionen gemacht worden sind, soll durch Bindencompression, Lagerung und Massage innerhalb 24 Stunden die ganze Exträmität von ihrem Oedem befreit werden. Während dieser Zeit bleibt die Wunde der dauernden

Ueberwachung und Verantwortlichkeit des Assistenten überlassen. Ist sämtliche Oedemflüssigkeit abgefloßen, dann wird nach allen antiseptischen Cautelen vernäht, ein Verband angelegt und die Extremität fernerhin eingewickelt gehalten. Wird es sich herausstellen, daß der Massage die wichtigste Mithilfe zur Entfernung des Oedems zuzuschreiben ist, so wären fernerhin die Incisionen proximal anzulegen, damit die Effleurage centripetal wirken kann.

Da die Trichterdrainage gefahrvoller ist als die Troicardrainage und weniger leistet als der einfache Schnitt, mithin weder die eine noch die andere Indication in befriedigender Weise zu erfüllen im Stande ist, so halte ich sie für eine ganz entbehrliche Erfindung.

Die Scarification und die wol kaum noch geübte Acupunctur sind wegen ihrer großen Gefahren ganz verwerflich. Ihre Leistungen sind durch die der Troikardrainage reichlich ersetzbar.

IV. Ueber die Indicationen der mechanischen Entleerung des Hautwassers.

Die Indicationen der chirurgischen Behandlung des Anasarca anlangend, soll zunächst auf die eingangsausgesprochene Ansicht zurückgegangen werden, daß jedes Oedem ein Cirkulationshinderniß repräsentirt, mit dessen Forträumung einer wichtigen Indication genügt wird: der Entlastung der Herzarbeit. In dieser Beziehung kommen alle von Kreislaufstörungen abhängenden Oedeme in Betracht.

Die Richtigkeit dieser Behauptung, so wenig sie betont zu finden ist, wird dennoch von der klinischen Erfahrung täglich bestätigt. Meinerseits versuchte ich es durch die 4

in extenso referirten Fälle des schuldigen Beweises gerecht zu werden. Kann nunmehr an der Wahrheit dieser Thatfachen nach klinischer Erfahrung nicht fernerhin gezweifelt werden, so bleibt nur noch die Verpflichtung übrig, eine plausible Vorstellung über das Werden und Zustandekommen dieser Thatfache zu entwickeln.

Gleichviel aus welchen mittelbaren Gründen, das Oedem entsteht, sobald einem gewissen Grade der Transsudation eine entsprechende Abfuhr durch das Venen- und Lymphgebiet nicht Stand hält. Bei diesem Mifsverhältnifs kann oder wird die Transsudation so lange fortgehen, bis der extravasculäre Druck dem intravasculären gleich ist.

Ist nun der Abflufs im venösen Gebiet und im Lymphstrom gestört, sei es, dafs hier selbst das Hindernifs liegt, wie bei gewissen Kreislaufstörungen, oder, dafs überhaupt mehr in der Zeiteinheit transsudirt wird, als abgeführt werden kann, wie es für das Oedem der Nephritiker angenommen werden mufs, so wird die Spannung in der extravasculären Parenchymflüssigkeit sich nicht umsetzen können in die lebendige Kraft der Bewegung, sondern als Druck direct auf den venösen Theil der Capillaren und Venen lasten und dadurch für die Circulation ein Hindernifs abgeben¹⁾.

Für die durch Höhlentranssudate auf diese Weise bewirkte Behinderung der Circulation sind die obigen Vorstellungen, wie ich denke, schon längst anerkannte. Quinke²⁾ hat besonderes Gewicht darauf gelegt. Die Belastung der Nierenarterien durch Ascites schätzt er auf 20—34 mm. Hg. nach eigenen Druckbestimmungen. «Für die Capillaren mit

1) cfr. Liebermeister Vorl. Bd. III. p. 241 u. ff.

2) Ueber den Druck in Transsudaten. D. Arch. f. d. M. Bd. 21. p. 459 u. 467.

ihrem geringeren Innendruck dürfte die Störung erheblicher sein, als für die Arterien».

In 2 Fällen von Hydrocephalus bestimmte er den Druck zu 30–40 mm. Hg., «so daß von dem Innendruck in den Gefäßen wegen des äußeren Druckes $\frac{1}{3}$ vielleicht sogar $\frac{1}{2}$ fortfällt, und der Capillar- und Venenblutstrom bedeutend erschwert sein muß». Einen handgreiflichen Beweis für die bedeutende Behinderung der Circulation sieht Quinke in der multiplen Thrombose der Schädelvenen, die er 2 Mal bei Hydrocephalus zu beobachten Gelegenheit hatte.

Den selben handgreiflichen Beweis wird man wol in einem Falle «essentieller Wassersucht» zu erblicken geneigt sein, den E. Wagner¹⁾ mittheilte. «Bei dem Kinde Henschel (Nr. 5) — sagt er — wurde eine (laut Sectionsprotocoll, über weite Strecken verbreitete,) Thrombose der Hautvenen gefunden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Thrombose meines Falles Folge der Herzschwäche und der durch das Oedem erschweren Circulation war».

Die bei dem Falle Henschel constatirte ausgiebige Thrombosirung der Hauptvenen, die als Stagnationsthromben zur Evidenz die Verlangsamung des Blutstromes in der ödematösen Haut beweisen, gewinnt noch ein weiteres Interesse, wenn man sich einer von Gerhardt gemachten Bemerkung erinnert. In seiner Abhandlung über den hämorrhagischen Infarct (Volkm. Samml. Nr. 91 pag. 16) heisst es: «Die antiseptische Behandlung der Wunden vermindert die Gefahr fortgesetzter traumatischer Thromben. Ganz besonders sind die Einstiche, welche bei Hautwassersucht mit so vortrefflichem Erfolge an den Unterschenkeln gemacht werden, nach den von Traube angegebenen Grundsätzen

1) Ueber essentielle Wassersuchten. D. Arch. für klin. Med. Bd. 41. p. 513.

nicht mit der Nadelspitze, sondern durch breite Lanzettstiche anzulegen und durch häufiges Bepinseln mit Chlorwasser und Chamäleonlösung rein zu halten. Gerade diese Einstiche werden bei Herzkranken ungemein häufig Ausgangspunkte der Embolie.» Ohne es wagen zu dürfen, einer durch Gerhardt's Autorität constatirten Thatfache zu nahe zu treten, kann ich dennoch die Erwägung nicht unterdrücken, ob nicht, wenigstens in einer gewissen Zahl von Fällen, die den Einstichen zur Last gelegten Embolis oft als Verschleppung der von Oedemen abhängenden Stagnationsthromben zu deuten sind. Nach dem Einstich wird die Circulation wieder flott und der Thrombus leichter fortgeschwemmt.

Abgesehen von diesen Beweisen einer durch das Oedem erschwerten Circulation, welche gewiß sehr häufig sind, aber nur selten constatirt wurden, können noch andere hinlänglich bekannte Erscheinungen als Ausdruck der obigen Anschauung citirt werden. Die oedematöse Haut des Nephritikers z. B. ist bleich, wachsartig anämisch; sie fühlt sich kalt an; wie viel schwerer sie als die eines Gefunden, wie oft sie garnicht zum Schwitzen gebracht werden kann, ist gleichfalls eine bekannte Thatfache; weil das Oedem die Capillaren comprimirt, fällt die *conditio sine qua non* des Schwitzens, die Hauthyperämie fort; ein Schnitt bis tief ins Unterhautzellgewebe, erzeugt auch nicht annähernd eine gefunden Verhältnissen entsprechende Blutung; der im Gewebe herrschende Druck behindert den Ernährungsstrom; als Ausdruck dessen constatiren wir Ernährungsstörungen aller Art und ihrer Folgen, der Gewebsnekrobiose mit consecutiver Nekrose, der Gangrän; oder die mechanischen Aeußerungen des excentrischen Druckes sind diesen nutritiven Schädigungen vorangeeilt; die Haut ist bis zur Diaphanität gedehnt, es entsteht Spontanruptur; entlastet man

die gespannte, faltenlose Haut durch einen Schnitt oder Stich, so stürzt das Wasser dem Messer entgegen oder entleert sich im Strahl aus dem eingestossenen Troikart, gewiss der sichtbarste Beweis, daß dasselbe unter einem gewissen Drucke gestanden hatte ¹⁾.

Neue, höchst wichtige Thatfachen, deren Gemeinfames gleichfalls beweist, daß jedes Oedem ein Circulationshinderniß bedingen müsse, brachte die Arbeit *Landerer's* ²⁾. Er versuchte experimentell den Nachweis zu liefern, «daß es für die Bewegung der Lymphe und des Blutes von größter Bedeutung sein müsse, daß sie innerhalb eines elastischen und elastisch gespannten Gewebes erfolgt.» «Die Capillarwand vermag dem Blutdruck nicht das Gleichgewicht zu erhalten; ein Theil desselben setzt sich durch dieselbe auf die Umgebung fort und droht für die Bewegung des Blutes in den Gefäßen verloren zu gehen. Diesen Theil trägt das Gewebe, wirft denselben auf den Gefäßinhalt zurück, vermöge seiner elastischen Spannung.» «Das Gewebe wirkt für die Blutbewegung in den Capillaren wie eine zweite elastische Gefäßwand, sie hat für dieselbe die Function der tunica media größerer Arterien, welche dem strömenden Blut seine lebendige Kraft erhält.» Diese lebendige Kraft geht nun beim Oedem zum Theil verloren, denn «beim Oedem findet sich jederzeit eine physikalische Störung des Gewebes, Verminderung des Elasticitätsmaßes und Unvollkommenheit der Elasticität.»

1) In sehr primitiver Weise versuchte ich einmal diesen Druck mit einem Hg-Manometer zu bestimmen, das ich mit dem Troikartschlauch zuvor verbunden hatte. Die Hg-Säule stieg um 4 mm. und zeigte bei jeder Inspiration — ich mass an der Bauchhaut des sub Tab. IV. Nr. 7 rubricirten Falles — eine weitere Steigerung um 1–2 mm.

2) Gewebsspannung in ihrem Einfluss auf die örtliche Blut- und Lymphbewegung. Leipzig 1884.

Das Herz wird diesen Verlust tragen müssen, und ihn durch vermehrte Arbeitsleistung zu decken versuchen. Andererseits folgt aus dieser Erwägung, daß das Herz entlastet werden müsse, sobald die Oedeme beseitigt werden, und das Gewebe seine normalen physikalischen Eigenschaften wiedererhalten hat.

Wenngleich ich nur selbst hinlänglich überzeugt bin, daß die eben unternommenen theoretischen Erklärungsversuche noch sehr mangelhafte sind, so muß ich doch an der durch die klinische Erfahrung ermittelten Thatfache, daß jedes Oedem die Circulation behindere, dem Herzen neue Arbeit auferlege, strengstens festzuhalten.

Aus dieser Ansicht erwächst in gewissen Fällen, wie ich sie z. B. früher referirte, für das therapeutische Handeln eine *Indicatio vitalis*. Die Wahl der Methode ist dann eine zweite Frage, über die ich bereits pag. 63 mich geäußert habe.

Als eine andere Indication muß die Entspannung der Haut betrachtet werden, um der Spontanruptur und deren Folgen: Erysipel, Gangrän, Phlegmone, und Septicämie vorzubeugen. Sie ist ebenso selbstverständlich wie wichtig! Wie oft wir auf diese Weise den gefährlichen Complicationen entgegen zu treten im Stande sind, läßt sich wohl niemals entscheiden, da das post hoc ergo propter hoc in Sachen der Prophylaxe unanwendbar ist. In einem Falle glaube ich jedoch eine sichere Verhütung des Spontanaufbruches erlebt zu haben. Es betraf den in Tabelle IV sub Nr. 6 angeführten P. D. Durch die mächtigen Oedeme war im Unterhautzellgewebe eine Continuitätstrennung bereits eingetreten, so daß freies Wasser unter der vollständig diaphanen Epidermis durchschimmerte. Es wurden aus der

unmittelbaren Nähe dieser Stelle 700 Ccm. entleert, die Haut faltete sich und der Aufbruch erfolgte nicht.

In anderen Fällen wird die Epidermis vom Derma abgehoben und zwischen beiden bilden sich Wasserbläschen; dann ist natürlich das Erkennen eines unmittelbar bevorstehenden Spontanaufbruchs leicht und eine sofortige Punktion indicirt. Anzuwenden ist der Troikart; sein Effect wird immer genügen.

Bei der Mehrzahl der Hydropischen wird die mechanische Behandlungsmethode nur einer *Indicatio symptomatica* genügen können. Spannungsgefühl, Schmerz und quälendes Gewicht sollen verringert werden. Ich habe es mehrfach erlebt, daß die Patienten nach einmal geschehener Punktion, sobald ihre Beschwerden wiederkehren, nach einer zweiten dringend verlangten. In auffallend schneller Weise wird auch gewöhnlich die Dyspnoe beseitigt, namentlich, wenn das Oedem sich auf den Rumpf und die Bauchdecken ausgedehnt hat.

Gerade für diese große Zahl bemitleidenswerther Fälle, wird der Arzt die Einführung des Troikarts aufs Freudigste begrüßen müssen, bietet er doch die größtmögliche Garantie einer ohne Gefahr zu beschaffenden Erleichterung; während die älteren Methoden der Scarification, Incision und Acupunctur, statt der Erleichterung, ein unter neuen Qualen beschleunigtes Ende herbeizuführen, allzu geeignet waren.

Schließlich möchte ich es nicht unterlassen, einige Bemerkungen an den von Klaatfch auf dem II. Congress zu Wiesbaden gemachten Vorschlag zu knüpfen. Wie schon erwähnt, hatte derselbe proponirt die Urämie durch die mechanische Entleerung des renalen Anafarcas prophylactisch zu bekämpfen, indem auf diese Weise der schädliche Harnstoff dem Körper entzogen werden sollte. Es

ist dieser Vorschlag um so weniger zu ignoriren, als bereits nahmhafte Lehrbücher¹⁾ denselben zu verbreiten sich anschicken.

Bekanntlich gehen die excrementellen Stoffe des Blutes in die Transsudatflüssigkeit über; ist das Blut mit denselben überladen, wie dieses bei aufgehobener oder doch darniederliegender Nierenfunction stattfinden muß, so wird auch die Transsudatflüssigkeit in gleichem Maße mit ihnen gesättigt sein, eine Resorption dieser Massen wird demnach unter Umständen Veranlassung zur Urämie geben können.

Die Erfahrung bestätigt die Richtigkeit dieses einfachen Gedankenganges. Schon Christison war es bekannt, daß Urämie sich häufig nach der Resorption renaler Transsudate einstellte. Durch Johnson²⁾ wird diese Thatfache wieder bestätigt. Einen allbekannten Beweis lieferte Bartels³⁾ classischer Fall. Bartels sieht in der Ausscheidung des Harnstoffes in die Gewebsflüssigkeit eine für den Organismus «unschädliche Deponirung» des letzteren; durch Resorption dieser Flüssigkeiten wachse die Gefahr der urämischen Intoxication. Mit derselben Bestimmtheit war schon früher Frerichs für diese Erfahrungsthatfache eingetreten: «mit der Resorption wachse die Gefahr⁴⁾», «reichliche Entziehungen hydropischer Flüssigkeit lassen die Intoxication verzögern⁵⁾». In demselben Sinne sprechen sich Rosenstein⁶⁾, Fürbringer⁷⁾, Hoppe-Seyler⁸⁾ aus.

1) cf. Fürbringer, Kr. der Harn- und Geschlechtsorg. 1884. p. 111; Niemeyer-Seitz, Lehrb. d. Path. u. Th. Bd. II 1885. p. 44.

2) l. c. p. 153.

3) l. c. p. 123.

4) l. c. p. 187.

5) l. c. p. 82.

6) Rosenstein, Nierenkrankheiten 1886. p. 351.

7) l. c. p. 42.

8) Hoppe-Seyler, Lehrbuch d. phys. Chemie 1881 p. 1907.

Wenn demnach die Ausprüche und Erfahrungen gerade der namhaftesten Kliniker auf dem Gebiete des Morb. Br. theoretisch den Vorschlag Klaatfch's zu stützen scheinen, so lassen sich doch schwere Bedenken gegen die praktische Durchführung dieser Mafsnahmen aufstellen.

Zunächst mufs eingewandt werden, dafs die mechanische Entleerung des renalen Anafarkas im Sinne einer Prophylaxe undurchführbar ist. Da urämische Zustände in jedem Augenblick des Krankheitsverlaufes, bei jeder Form des Morb. Br., häufig scheinbar unmotivirt und ohne jede Ankündigung, auftreten können, so müfste man jedes renale Anafarka unäufhörlich punctiren, wollte man eine Prophylaxe gegen die Urämie durchführen. Es kann sich demnach lediglich um die Frage handeln, ob dem Verfahren bei der specifischen Behandlung der manifesten Urämie ein Platz neben den anderen Mitteln eingeräumt zu werden verdient. Ich glaube, es wäre verfrüht, eine entscheidende Antwort auf diese Frage zu geben, bevor erstens die klinische Beobachtung nach dieser Richtung hin zu Resultaten gekommen ist und zweitens, bevor die chemische Analyse der Anafarkaflüssigkeit an der Lösung der Frage genügend mitgeholfen hat.

Klinische Erfahrungen existiren bisher nicht und das zu erwartende Resultat ist höchst ungewifs. Die chemische Analyse aber des Blutes und der Transudate von Nephritikern liegt noch sehr im Argen. Es ist dies aus vielen Gründen sehr erklärlich. Der hauptsächlichste Grund ist der, dafs die urämischen Noxe allzu lange ein strittiger Gegenstand gewesen ist. — Nach dem gegenwärtigen Stande der Frage, scheint indess diejenige Theorie am besten fundirt zu sein, die in der Retention aller oder mehrerer excrementeller

Stoffe mit besonderer Hervorhebung des Harnstoffes den Grund der Urämie sieht. Ich habe daher geglaubt dem Harnstoff eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden zu müssen und daher mehrfach das Hautwasser von Nephritikern auf sein Harnstoff-Procent untersucht.

Bevor ich diese Analysen mittheile, erlaube ich mir frühere theils mit Blutserum, theils mit verschiedenen Transsudaten von Nephritikern vorgenommenen Analysen aufzuführen:

1. Normales Blutserum enthält 0,024 bis 0,053 % U.¹⁾.

2. Bei Nephritis fand:
Babington 1,5 % im Blutserum, pag. 310, cit. nach Bartels.
Guy's Hosp. Reports 1836.

Rees	0,0415 im Hydroceph.	{	Nach einem Auszuge aus Guy's Hosp. Rep. Nr. 10. Rees l. c. p. 95.
	0,0209 » Blutserum		
	0,015 in d. Anafarkafl.		

Marchand	0,42 im Ascites	{	Simon, Antropochemie Th. II, p. 581.
Simon	0,12 im Anafarka		

Heller	0,174	{	im Blutserum	Bei Frerichs, l. c. p. 73.
	0,184			

Frerichs	0,162	{	in div. Transsud.	{	l. c. p. 82.
	0,105				
	0,145				

Edlefsen	0,258 im Blutserum	{	cit. bei Bartels, l. c.				
	0,359 im Anafarka						
	0,3			{	im Ascites		
	0,28						
	1,0					{	im Pericard.

1) Nach d. neuesten Bestimmungen von Pekelharing, Munk und Gscheidlén, cfr. Leube u. Salkowski d. Lehre v. Harn. 1882. pag. 29.

Picard	0,07 0,084	} im Blutserum	} cit. nach Rosenstein l. c. p. 210.
Kopp	0,056		
		im Anafark.	l. c.

3. Bei Lebercirrhose fand

Hoppe Seyler	0,031 0,026 0,021	} im Ascites.	l. c. p. 103.

Indem ich diese Analysen nur der Vollständigkeit wegen anführe, wage ich es nicht, irgend welche Schlüsse aus denselben zu ziehen, da mir ein Urtheil über den Werth derselben nicht zusteht.

Ich selbst habe 8 Mal Anafarkaflüßigkeit analysirt. 7 Mal entstammte sie Patienten, welche an Morb. Br. litten; 1 Mal entnahm ich sie einer Patientin, deren Oedeme sich auf einen musculären Herzfehler zurückführen ließen. Die Analysen wurden nach der Hüfner-Knopf'schen Methode, genau nach den Vorschriften Salkowski's¹⁾ ausgeführt. Jeder der 8 Angaben entsprechen 2—3 gemachte Analysen, welche ich zur Controlle unternahm.

Es waren ff. Fälle:

1) l. c. p. 51 u. ff.

1.	Caroline Silling. Neph. anyl. cf. Tab. IV. Nr. 11.	8. II. Analyse d. Harnes Analyse d. Hautwassers 11. II. Analyse d. Harnes 15. II. „ „ „ 20. II. Analyse d. Hautwassers	— 0.043 % — 0.02 %	0.86 % 1.79 % 1.22 %	Mächtige Oedeme. Niemals Urämie. Die anfangs colossalen Eiweissmengen im Harn sinken zum exitus hin continüirlich; am 24. II 0.1 % Eiw. (polarimetrisch bestimmt). Die Diurese war stets verringert.
2.	Anna Maibsit. Neph. parench. cf. Tab. IV. Nr. 7.	11. II. Analyse d. Harnes „ „ „ Hautwassers 17. II. „ „ „ 18. II. „ „ „ 20. II. „ „ „	— 0.039 % 0.031 % 0.037 % 0.035 %	2.37 %	Gute Diurese; niemals Urämie; mächtiges Oedem. Das aus der Bauchhaut entleerte Serum gerann sofort, während dieses nicht eintrat, sobald am Oberschenkel punktiert wurde. 20. II 0.4 % Eiw. im Harn.
3.	Awdotja Makejewa. Mr. Br. cf. Tab. IV. Nr. 12.	19. III. Analyse d. Harnes „ „ „ Hautwassers	— 0.057 %	0.287 %	Sehr verringerte Diurese. Mässiges Oedem. Tags vor und nach der Punction (700 CC.) trat ein urämischer Anfall auf.
4.	Aeafja Chachlowa. Myodeg. cord. cf. Tab. IV. Nr. 8.	14. II. Analyse d. Hautwassers	0.046 %		

$\frac{+}{\text{U}}$ im Hautwasser 0.02 %.
 Min. „ „ „ 0.057 %.
 Max. „ „ „

Die Anafarkaflüssigkeit der 2 ersten Patientinnen, welche niemals urämisch gewesen waren, enthielten gerade soviel $\frac{+}{U}$. als normaler Weise für das Blutserum angenommen werden muß. Das Transsudat der 3. Patientin, die mehrmals, so unter anderen auch tags vor und nach der Punction, urämisch war, wies zwar die größte von mir gefundene Menge auf, doch war der Gehalt immer noch nicht so groß, daß sich mit der Entfernung selbst vieler Liter Flüssigkeit irgend welcher Nutzen für die Pat. erwarten liesse. Im 4. Fall wurde gleichfalls $\frac{+}{U}$. nachgewiesen, obgleich es sich um einen Fall von Myodeg. cord. handelte. Damit ist dann die absolute Gleichgiltigkeit solcher Procentsätze für den Organismus bewiesen; ein Schluß, der sich bereits aus den H o p p e - S e y l e r'schen Analysen der Ascitesflüssigkeit bei Lebercirrhose hätte machen lassen.

Soll demnach wirklich ein therapeutischer Nutzen durch die mechanische Entfernung des renalen Anafarkas geschaffen werden, so müßte der Gehalt an excrementellen Stoffen, speciell an Harnstoff die angeführten Zahlen bei Weitem überschreiten. Mögen kommende Analysen, zu denen ich hierdurch gern Anregung gegeben haben möchte, neue Erfahrungen bringen. Bis dahin dürfte die Durchführung des von K l a a t s c h gemachten Vorschlages billigerweise zurückzustellen sein.



Thesen.

1. Jedes Oedem repräsentirt ein Circulationshinderniß und schädigt proportional seiner Dauer und Stärke die Herzarbeit.
 2. Im ganzen Lister'schen Verbands bildet die medicinische Watte die *conditio sine qua non*.
 3. Die Meningitis cerebro spinalis epidemica ist keine epidemica.
 4. Wo phthisische Disposition vorliegt, muß das Herz geschont und geübt werden.
 5. Private Schlachthäuser in einer Commune sind absolut unstatthaft.
 6. Das beste Dioreticum bei cardialen Hydropsien ist Calomel.
-

